

## BLEPHARIS

**Blepharis edulis (Forssk.) Pers.**

600 – **BLEPHARIS CILIARIS** (L.) B.L. Burt, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb., 22: 94 (1956); Lebrun et Peyre de Fabrègues, Adansonia, sér. 2, II: 108-109 (1971).

bas.: *Ruellia ciliaris* L.

syn.: *Ruellia persica* Burm. f.; *Acanthus edulis* Forssk.; *Blepharis edulis* (Forssk.) Pers.; *Acanthodium spicatum* Del.; *Blepharis persica* (Burm. f.) O. Kuntze; *B. linariifolia* auct.: H. Heine in Hutch. et Dalz., Fl. West Trop. Afr., éd. 2, 2: 410 p.p., quoad spec. Cheval. 28806 (1963), non Pers.; *B. edulis* (Forssk.) Pers. var. *gracilis* Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N., 29: 441 (1938) – *Syntypes de Mauritanie*: Murat 1990, 2246, Inchiri près Akjoujt, 1358, Adrar près Choum.

☞ Le véritable *B. ciliaris* existe bien dans l'Ouest africain, mais sous une forme réduite; celle-ci se rencontre aussi au Sudan et au Kenya, plus rarement dans la partie orientale de l'aire de l'espèce (fide Napper in sched.). Cette petite forme se distingue très bien du *B. linariifolia* tout particulièrement par ses feuilles bien plus courtes (env. 3-4 cm), profondément et régulièrement lobées, ne dépassant pas longuement les épis; c'est certainement la plante décrite par Maire en 1938.

☞ Barry 514, entre Moudjeria et Tidjikja, creux ensablé au pied de blocailles et d'une petite falaise; 787, entre Atar et Choum, oued; Charles in Chevalier 28806, Edderoum. Mali, Niger, Tchad (Tibesti et Ennedi), Sudan, NE de l'Afrique orientale – Arabie, Iran, Pakistan.

601 – **B. LINEARIIFOLIA** Pers., Syn., 2: 180 (1806); Monod, Contr. Etud. Sah. Occ., 2: 113 (1939).

☞ Monod 1939: env. de Tidjikja et de Tamchakett; Monod 1952: env. de Moulekhterat; Sauvage 1953: plaine du Regueibat, Baten du Tagant; Foug Kaskasset.

☞ Boudet 545, vers El Beyed, dune ± mobile; Miss. Et. Biol. Acrid. 105, Dandaré; du Puïgaudeau s.n., de Bou Zériba au lac Faguibine (Mali); Fourré s.n., Hodh; Chudeau s.n., Letfatar.

De la Mauritanie et du Sénégal à l'Éthiopie, Djibouti, Somalie; Kenya; Angola ?, Botswana.

602 – **B. MADERASPATENSIS** (L.) Heyne ex Roth, Nov. Pl. Sp. Ind. Or.: 320 (1821); Napper, Kew Bull., 24: 323 et fig. 1 p. 324 (1970).

bas.: *Acanthus maderaspatensis* L.

– subsp. **rubiifolia** (Schumach.) Napper, l.c.: 325.

bas.: *B. rubiifolia* Schumach.

syn.: *B. boerhaaviifolia* Pers. var. *nigrovenulosa* De Wild. et Th. Dur.

☞ Sauvage 1953: Haceira.

Aire de la sous-espèce: du Sénégal à la République Sud-africaine et à la Namibie.