

Aizoon canariensis L.



Han

Synonyme : *Aizoon procumbens* Crantz

Description : plante prostrée, de taille variable en fonction des réserves hydriques disponibles. Le diamètre des touffes varie de quelques centimètres à plus de 50 centimètres. **Rameaux** robustes sub-lignifiés, persistant après la mort des individus. **Feuilles** moyennes plus ou moins charnues, velues, jaunissant ou rougissant avant le dessèchement. **Fleurs** petites, à l'aisselle des feuilles, jaunâtres, rougissant lors de la formation du **fruit** (capsule).

Biogéographie : espèce saharo-sindienne.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte.

Port : herbe annuelle en coussinet.

Préférences édaphiques : sols sableux, limoneux et plus ou moins caillouteux.

Préférences hydriques : espèce eury-xérophile.

Tolérance aux sels : moyenne.

Biotopes : espèce colonisant regs, glacis ou oueds aux sols plus ou moins équilibrés, souvent parsemés de cailloux et pouvant être plus ou moins salés.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : peu d'intérêt, tant pour l'abri que pour la nourriture. Se rencontre dans les biotopes de survie ou de reproduction.

Espèce voisine : *Aizoanthemum hispanicum* (L.) H.E.K. Hartmann, espèce ouest-méditerranéenne beaucoup moins fréquente, est une herbe annuelle semi-érigée.

Références bibliographiques

Ozenda	203	Quézel & Santa	310	Barry & Celles	11	Nègre	I-192
--------	-----	----------------	-----	----------------	----	-------	-------



Aspect général.



Fruits.



Feuilles et fleurs.



Individu sec.



Espèce voisine : *Aizoanthemum hispanicum*.

