

CHENOPODIACEAE

Bassia muricata (L.) Asch.



Han

Basionyme : *Salsola muricata* L. (1767)

Synonyme : *Echinopsilon muricatus* (L.) Moq. (1834)

Description : plante très rameuse, velue, formant de petites touffes denses. **Tiges** semi-érigées, plus ou moins grêles et raides. **Feuilles** étroites de couleur grise. **Fleurs** petites, groupées par deux à l'aisselle des feuilles, calice laineux ; chaque sépale est muni d'une épine qui s'allonge à maturité.

Biogéographie : espèce saharo-sindienne.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte.

Port : espèce annuelle touffue formant de petits buissons assez fragiles.

Préférences édaphiques : espèce des sols lourds.

Préférences hydriques : espèce xéro-mésophile.

Tolérance aux sels : espèce plus ou moins tolérante.

Biotopes : espèce des sols lourds que l'on rencontre dans les lits d'oued (banc d'argile) dans certains épandages mais aussi dans les oasis.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : peu d'intérêt mais espèce assez fréquente et indicatrice des sols lourds et légèrement salés.

Références bibliographiques

Ozenda	226	Quézel & Santa	297	Barry & Celles	144	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--



Petite touffe, tiges plus ou moins grêles et retombantes, semi-érigées.



Sépales longuement épineux à maturité.

