

CHENOPODIACEAE

Chenopodium murale L. var. *murale*



Han

Synonyme : *Chenopodium murale* L. (1753)

Description : espèce dressée, assez pubérulente, ne dépassant pas 60 centimètres de haut. **Tiges** souvent rougissantes. **Feuilles** plus ou moins triangulaires et dentées. **Inflorescence** terminale.

Biogéographie : espèce cosmopolite et rudérale.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte.

Port : plante annuelle.

Préférences édaphiques : espèce des sols sablo-limoneux. Apprécie également les sols riches en azote.

Préférences hydriques : espèce eury-xéro-mésophile.

Tolérance aux sels : modérée.

Biotopes : espèce rudérale, souvent adventice des cultures mais aussi, çà et là, dans la végétation naturelle (lits d'oued). Indicatrice de l'anthropisation des biotopes.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : espèce peu appréciée.

Espèces voisines : *Chenopodium album* L. se distingue par ses feuilles de couleur blanche sur la face inférieure, pouvant atteindre plus de 1,20 mètre de haut. Espèce également rudérale mais méditerranéenne.

Chenopodium vulvaria L., espèce semi-érigée, inflorescence en grappes courtes, est une plante blanchâtre, pubérulente et malodorante.

Chenopodium ambrosioides L. se distingue par une forte odeur aromatique, un toucher assez visqueux. C'est une plante des décombres, vraisemblablement originaire d'Amérique centrale.

Références bibliographiques

Ozenda	225	Quézel & Santa	292	Barry & Celles	142	Nègre	I-175
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	-------



Jeune individu en tout début de floraison.

