

Cornulaca monacantha Delile



Lbas

Description : espèce formant des buissons épineux très branchus et denses, pouvant dépasser 1,20 mètre de haut. Très recherchés par les dromadaires, ces buissons sont alors souvent mutilés et rabougris. **Feuilles** alternes, coriaces, terminées par une pointe courbée vers l'extérieur. **Fleurs** petites, jaunes, groupées à l'aisselle des feuilles (par 1 à 3), 5 sépales, dont un muni d'une soie épineuse.

Biogéographie : espèce saharo-sindienne à tendance méditerranéenne.

Type biomorphologique de Raunkier : grand chamaephyte.

Port : ligneux bas constituant un excellent abri pour la faune sauvage, surtout quand il est isolé au milieu de vastes regs.

Préférences édaphiques : espèce des sols limono-sableux.

Préférences hydriques : espèce hyper-xérophile et très résistante à la sécheresse.

Tolérance aux sels : assez faible.

Biotopes : espèce saharienne par excellence, que l'on retrouve sur des sols plus ou moins sableux et compacts. Indicatrice des conditions désertiques, sa distribution est complémentaire de celle de *Cenchrus biflorus* qui souligne l'influence sahélienne méridionale.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : peut servir d'abri et de nourriture.

Références bibliographiques

Ozenda	239	Quézel & Santa	298	Barry & Celles	144	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--



Petit individu en repousse après les pluies.



Détail des tiges feuillées, feuilles alternes et terminées en pointe recourbée.



Fleurs jaunes, regroupées à l'aisselle des feuilles.

