

Ammodaucus leucotrichus Coss. & Durieu



Han

Synonymes : *Ammodaucus leucotrichus* subsp. *leucotrichus*
Cuminum maroccanum P.H. Davis & Hedge (1972)

Description : plante odoriférante, érigée. **Tige** striée, rameuse dès la base. **Feuilles** moyennes (de 10 à 20 centimètres), très divisées (pennatiséquées). Appareil végétatif glabre. **Fleurs** réunies en ombelles, de petite taille et de couleur blanche plus ou moins rosée. **Fruits :** akènes de près d'un centimètre de diamètre, couverts de longs poils blancs. La plante dégage une forte odeur anisée et les fruits sont utilisés en infusion.

Biogéographie : espèce saharo-méditerranéenne.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte.

Port : herbe annuelle érigée, pouvant former de belles touffes (30 centimètres de haut et environ 50 centimètres de diamètre).

Préférences édaphiques : espèce psammophile et héliophile. Se rencontre également dans certaines rocailles ensablées.

Préférences hydriques : espèce résistante à la sécheresse, de saison fraîche (hiverno-printanière).

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : plante des sables de la zone sous influence méditerranéenne et désertique, pouvant être localement abondante.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : l'espèce présente peu d'intérêt. Elle est néanmoins susceptible de fournir un bon abri pour les larves en cas de fort développement.

Références bibliographiques

Ozenda	36	Quézel & Santa	659	Barry & Celles	343	Nègre	
--------	----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--



Aspect général.



Fleurs.



Fruits.



Fruits recouverts de longs poils blancs, roux à la base.



Grande touffe dans un biotope de reproduction.

