


PLANCHE LIV

PITURANTHOS BATTANDIERI. — Maire

PITURANTHOS BATTANDIERI. — Maire, in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique du Nord, 9, p. 177, 1918 ; Battandier, Contrib. à la Flore Atlantique, Alger, 1919, p. 38.

Suffrutex caespitosus, rigidulus, sub anthesi basi valde foliosus, superne nudus ; caulibus albido-glaucis, fere a basi ramosis, inferne tenuiter sulcatis, pubescenti-scabridis, superne glabris, obsolete sulcatis l. laevibus ; ramis inferioribus ascendentibus, superioribus plus minusve divaricatis, tenuibus ; foliis inferioribus numerosis, longe pedunculatis, albido-glaucis, trisectis, laciniis linearibus trisectis, segmentis-terminalibus longis, linearibus, apice acutiusculis, plus minusve divaricatis, rigidulis, glabrescentibus, margine scabridis, vaginis brevibus, ovatis, scariosis, amplexicaulibus ; foliis mediis conformibus minus divisus, sursum ad laciniam unicam subsessilem reductis ; foliis superioribus ad vaginam reductis ; umbellis 4-6 radiatis, radiis subfiliformibus, subaequalibus ; involucri ante anthesim decidui, sub-5-phylli, phyllis lanceolatis, acutis, albidis, margine scariosis vix erosulis ; umbellulis 4-8-radiatis, radiis floribus 2-3-plo longioribus ; involucelli sub-5-phylli, sub anthesi decidui, phyllis ovatis alabastra juniora subaequantibus, dorso albido-glaucis minutissime tuberculatis, marginibus late scariosis erosulis, apice mucronatis ; petalis sub anthesi arcuato conniventibus, vix hiantibus, late ovatis, lacinia inflexa longiuscula hyalina erosula apice auctis, nervo medio lato crasso, flavo-virenti, rufo-purpureo suffuso, extus pilis l. tuberculis crassis, albis, laxiuscule furfuraceo, marginibus albidis glabris vix erosulis ; antheris luteis ; stylopodiis anguste conoideis, margine vix depresso subundulato-crenato ; stylis stylopodia subaequantibus ; stigmatibus atro-purpureis ; ovario pi-



Pituranthos Battandieri MAIRE

lis crassis albis longiusculis dense furfuraceo-subtomentoso ; fructibus.....

Habitat : in planitiibus glareosis ad radices australes montis Grouz in finibus Imperii Maroccani austro-occidentalis et Algeriae, a Figuig usque ad Kenadsa, ubi junio floret.

P. chlorantho (Coss. et Dur.) affinis, a quo differt foliis caulibusque albido-glaucis, foliorum limbo sub anthesi persistenti, caulibus gracilibus, ramis floriferis valde divaricatis, petalorum nervo angustiore et marginibus vix erosulis, stylopodiis anguste conoideis margine vix depressis, vix undulato-crenatis, stigmatibus purpureis, etc. *P. denudatus* Viv. differt caule nudo evidentius sulcato, radiis umbellarum validioribus, involucelli phyllis suborbiculatis, etc. Aliae species longius distant.

EXPLICATION DE LA PLANCHE

A gauche un spécimen commençant à fleurir, à droite un rameau fleuri d'un autre spécimen, réduits à 0,46.
