

### *Eryngium ilicifolium* Lam.



Han

**Description** : plante érigée de couleur vert bleuté, assez glauque, épineuse. **Tige** rameuse rigide, souvent de couleur claire. **Feuilles** de la base spatulées, dentées, épineuses, nervures principales marquées de blanc. **Fleurs** petites, peu visibles, réunies en ombelles contractées, capituliformes, entourées d'une collerette de bractées épineuses. Au froissement, l'ensemble de la plante libère une odeur caractéristique d'ombellifère.

**Biogéographie** : espèce méditerranéenne (Maghreb) du Sahara septentrional et occidental.

**Type biomorphologique de Raunkier** : thérophyte.

**Port** : herbe annuelle érigée. Peut prendre un port subrampant sous l'effet du broutage par les ruminants.

**Préférences édaphiques** : sols plus ou moins lourds et rocailleux.

**Préférences hydriques** : espèce xérophile, supportant une demi-ombre modérée.

**Tolérance aux sels** : non.

**Biotopes** : Peu fréquente, cette espèce se développe dans les oueds, les épandages ou les bas de pente plus ou moins rocailleux.

**Intérêt pour le Criquet pèlerin** : cette plante présente peu d'intérêt mais est indicatrice des biotopes de survie et de reproduction.

#### Références bibliographiques

Ozenda	359	Quézel & Santa	650	Barry & Celles		Nègre	II-95
--------	-----	----------------	-----	----------------	--	-------	-------



Aspect général.



Le passage de la feuille spatulée peu épineuse à la bractée à trois épines vulnérantes est progressif.



Inflorescences.

