

## *Phoenix dactylifera* L.



Lhaut

**Synonyme :** *Phoenix atlantica* var. *maroccana* A. Chev.

**Description :** grand arbre de plus de 12 mètres, dioïque, dont le **stipe** (tronc) ne se divise pas. **Feuilles** pennées à pétiole épineux. **Fleurs** petites, inflorescence rameuse d'un beau jaune orangé. Le **fruit** est une drupe (datte) dont le mésocarpe est tendre ou dur selon les nombreuses variétés qui ont été sélectionnées.

**Biogéographie :** espèce saharo-sindienne cultivée de longue date.

**Type biomorphologique de Raunkier :** méso-phanérophyte palmiforme.

**Port :** grand palmier à stipe unique.

**Préférences édaphiques :** espèce appréciant les sols sableux ou limoneux.

**Préférences hydriques :** espèce mésophile des régions désertiques donc phréato-dépendante.

**Tolérance aux sels :** modérée.

**Biotopes :** oasis sahariennes, à proximité immédiate de nappes phréatiques affleurantes, sub-affleurantes ou suivant les inféroflux. Tous ces biotopes sont peu ou prou anthropisés.

**Intérêt pour le Criquet pèlerin :** **PLANTE IMPORTANTE**. Ce taxon offre abri et nourriture. En période d'invasion, les dégâts causés par le Criquet pèlerin peuvent être très importants.

### Références bibliographiques

Ozenda	130	Quézel & Santa	178	Barry & Celles	365	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--



Aspect général.



Petite oasis sur inféoflux.



Fruits (dattes).



Oasis nord-saharienne sur nappe phréatique sub-affleurante.

