

Asphodelus tenuifolius Cav.



Han

Synonymes : *Asphodelus fistulosus* auct.
Asphodelus fistulosus subsp. *tenuifolius* (Cav.) Batt.
Asphodelus maroccanus Gand. (1908)
Verinea tenuifolius (Cav.) Pomel (1860)

Description : l'appareil végétatif forme une petite touffe (10 à 12 centimètres de haut). **Feuilles** cylindriques creuses (2 à 3 millimètres de diamètre), rosissant en séchant. **Inflorescence** rameuse. **Fleurs** blanches avec une bande médiane ocre. **Fruit** : petite capsule sub-sphérique portée par un pédoncule restant érigé au-delà de la maturité.

Biogéographie : espèce saharo-sindienne à forte tendance méditerranéenne.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte.

Port : herbe annuelle.

Préférences édaphiques : espèce des terrains limoneux et sableux, tolérant l'argile.

Préférences hydriques : espèce xéro-mésophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : plante souvent sociale des pelouses xéro-mésophiles, se développant dans les épandages en marge des regs, en zone d'influence méditerranéenne plus ou moins marquée.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : sans intérêt, mais l'espèce est indicatrice de biotopes de survie ou de reproduction, lorsque les conditions écométéorologiques sont favorables.

Espèces voisines : en zone saharo-méditerranéenne, on rencontre également *Asphodelus refractus* Boiss. Beaucoup moins fréquente, elle semble préférer des sols sableux plus grossiers. Les feuilles sont généralement plus longues et les pédoncules des fruits s'inclinent vers le sol à la maturité du fruit.

En zone méditerranéenne, plusieurs autres espèces appartenant au genre *Asphodelus* sont présentes, voire localement abondantes.

Références bibliographiques

Ozenda	132	Quézel & Santa	194	Barry & Celles	376	Nègre	I-116
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	-------



Aspect général.



Fleurs.



Fleur (détail).



Individu portant des fruits.



Espèce voisine : *Asphodelus refractus*.

