



Artemisia (Seriphidium) Hugueti sp. nov. (fig. 2).

Frutescens, suaveolens, erecta, usque 80 cm. alta, ramosissima, ramis striatis lignosis, erectis, basi tomentellis, sursum albocinereis; foliis basi auriculatis petiolatisque trimorphis, summis simplicibus vel trifidis, 5 mm. longis, intermediis uni-bipinnatif-

dis, 20 mm. longis, istis illisque albocinereis, reliquis bipinnatifidis subglabris, rachi laciniisque angustioribus, 60 mm. longis, omnibus margine revolutis; calathiis sessilibus oblongis, erectis 3 mm. longis, trifloris, paniculatis, ramis paniculae erectis; squamis capituli imbricatis, obovatis, late scariosis, dorso rubro vit-




Fig. 2.—*Artemisia Hugueti* sp. n.: *a*, rama de la sumidad, con las hojas supremas y con los botones florales; *b*, hoja intermedia; *c*, hoja de la base. *a* y *b*, aumentadas en la relación de 1 a $2\frac{3}{4}$; *c*, tamaño natural.

tatis; achaeniis ¿costatis?, glabris, 0,8 mm. longis. A claro botánico Huguét del Villar dicata species.

Es una planta que vive copiosa en la llana de Sidi Ifni, muy especialmente al pie del Buhalam, asociada con el matorral de argán, con el dajmus y con el fernan. El día 14 de julio herboricé unos cuantos pliegos de ella, pero todavía sin flores, con la fortuna de lograr algunas ramas con las cabezuelas, en aceptable estado de conservación, del año anterior, que me han permitido completar con cierta exactitud la descripción de los órganos reproductores, y fijar con toda precisión el parentesco de

esta nueva *Artemisia*, que, desde luego, pertenece a la sección *Seriphidium* Bess., al lado de *Artemisia Barrelieri* B. y de *A. Herba alba* Asso.

Posee esta especie un aroma muy agradable, especialmente intenso, aun en seco, cuando se trituran las hojas entre los dedos y que recuerda, sin embargo, la esencia de trementina; este carácter la separa ya de las dos especies próximas mencionadas, que tienen un olor desagradable; pero el carácter botánico verdaderamente diferencial se encuentra en las hojas inferiores, que se dibujan con las intermedias y con una rama floral todavía muy joven, en la figura 2; estas hojas inferiores, que se elevan a veces y se mezclan con las intermedias, tienen un largo pecíolo y alcanzan hasta 60 mm. de longitud, además de ser más estrechas, más finas que las otras y son verdaderamente características de *Artemisa Hugueti*. Las hojas medias y las de la sumidad se aproximan algo más a las de *A. Barrelieri*, aunque todavía diferentes de las de *A. Herba alba*. Sin embargo, se acerca más nuestra especie a esta última por las cabezuelas y, sobre todo, por el número de las flores que llevan éstas. Los aquenios presentan, al parecer, costillas longitudinales, y, si así fuera, se contaría con otro carácter diferencial importante respecto de las dos especies próximas indicadas. Sea de ello lo que quiera, *Artemisa Hugueti* parece constituir un tipo específico bien definido.