

# ASTERACEAE

---

## *Atractylis babelii* Hochr. var. *babelii*



Han

**Synonyme :** *Atractylis babelii* Hochr. (1904)

---

**Description :** réputée vivace, cette plante se comporte très souvent en annuelle. C'est une plante semi-érigée, rameuse. **Feuilles** vert glauque, épineuses, d'aspect charnu. **Bractées** munies de part et d'autre de lobes réguliers, formant des peignes à larges dents, caractéristiques du taxon. **Fleurs** jaunes, réunies en capitules globuleux de 2 à 4 centimètres de diamètre.

**Biogéographie :** espèce du Nord-ouest saharien (endémique maghrébine).

**Type biomorphologique de Raunkier :** thérophyte pouvant se comporter en chamaephyte.

**Port :** espèce herbeuse semi-érigée, robuste.

**Préférences édaphiques :** sols sablo-limoneux, éventuellement rocailleux.

**Préférences hydriques :** espèce xérophile.

**Tolérance aux sels :** non.

**Biotopes :** épandages limono-sableux et rocailles ensablées de bas de pente. Moins commun qu'*Atractylis aristata*.

**Intérêt pour le Criquet pèlerin :** espèce sans grand intérêt mais assez présente dans les biotopes de reproduction en région saharo-méditerranéenne.

### Références bibliographiques

Ozenda	448	Quézel & Santa	999	Barry & Celles	72	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	----	-------	--



Aspect général.



Jeune plant.



Capitule avec bractées en peigne bien visibles.



Individu moribond.

