

Catananche arenaria Coss. & Durieu



Han

Description : petite espèce herbeuse annuelle. **Feuilles** velues, étroites, simples ou pennatilobées.

Fleurs réunies en capitules pauciflores longuement pédonculés. **Bractées** involucreales scarieuses (translucides). La nervure centrale brune se prolonge par une pointe raide. **Fleurs** : les ligules florales sont blanches, brun violacé à la base et lavées de violet sur la face externe. **Fruits** : l'aigrette des akènes se réduit à cinq écailles membraneuses terminées par une longue soie.

Biogéographie : espèce saharo-méditerranéenne, endémique nord-africaine.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte.

Port : plante en rosette. Tiges florales longues et grêles.

Préférences édaphiques : espèce psammophile.

Préférences hydriques : espèce xérophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : pelouses thérophytiques sur les sols limono-sableux et ravines ensablées.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : espèce sans grand intérêt mais assez présente dans les biotopes de reproduction en région saharo-méditerranéenne.

Espèce voisine : ne pas confondre avec *Picris asplenioides* L. subsp. *asplenioides*.

Références bibliographiques

Ozenda	457	Quézel & Santa	1052	Barry & Celles	61	Nègre	
--------	-----	----------------	------	----------------	----	-------	--



Aspect général.



Fleurs.



Bractées.

