

## *Launaea arborescens* (Batt.) Maire



**Basionyme :** *Zollikoferia arborescens* Batt. (1889)

**Lbas**

**Synonymes :** *Launaea freyniana* (Huter & Porta) Pau (1928)  
*Launaea melanostigma* Pett. (1960)  
*Sonchus freynianus* Huter, Porta & Rigo (1907)

**Description :** buisson moyen (moins de 1 mètre de haut) dense et épineux. **Tige** très rameuse dès la base, rigide, de couleur verte plus ou moins glauque. Les **rameaux** deviennent épineux en vieillissant. **Feuilles** étroites, assez rapidement caduques (tombant avant la floraison). **Fleurs** réunies en petits capitules latéraux, de couleur jaune. **Akènes** anémochores dotés d'une aigrette blanche peu fournie.

**Biogéographie :** espèce de l'Ouest saharo-méditerranéen.

**Type biomorphologique de Raunkier :** chamaephyte (de grande taille).

**Port :** buisson dense, globuleux et épineux.

**Préférences édaphiques :** espèce des sols sablo-limoneux.

**Préférences hydriques :** espèce xérophile et résistante à la sécheresse.

**Tolérance aux sels :** espèce pouvant être tolérante à de faibles concentrations.

**Biotopes :** espèce assez fréquente en zone d'influence méditerranéenne, aux abords des oueds et de certains épandages.

**Intérêt pour le Crique pèlerin :** peut servir d'abri aux larves comme aux ailés mais ne constitue une réelle ressource alimentaire que lors de la feuillaison.

### Références bibliographiques

Ozenda	460	Quézel & Santa	1064	Barry & Celles	61	Nègre	II-358
--------	-----	----------------	------	----------------	----	-------	--------



Individus de taille moyenne.



Fleurs et feuilles.



Fruits.

