


**Senecio hoggariensis** nov. spec. e sectione *Obæjaca* Cassini  
(Pl. XXI).

Annuus, glaber, a basi ramosus. Folia carnosula, ambitu lanceolata, in lacinias lineares obtusiusculas, integras vel remote denticulatas divisa, cum rachi anguste lineari; infima in petiolum basi dilatatum attenuata, suprema semi amplexicaulia, basi minute auriculata. Capitula laxè corymbosa. Pedunculi bracteati capitulo subduplo longiores. Involucrum cylindraceo campanulatum, 10-12 mm. longum, squamis 12-15, trinerviis, atropurpureis, linearibus, apice vix sphacelatis, basi squamulis brevibus, paucissimis calyculatum. Ligulæ femineæ, purpureæ, paucæ, minutæ, vix radiantés. Flosculi flavi, hermaphroditi, quinquentati. Achenia linearia, costulata, 4 mm. longa, pilis cristallinis brevibus adpresse hirta. Pappus deciduus achenio longior et involucrum paulo superans.

Hab. in ditone Ahaggar.

Ce Seneçon est remarquable par ses ligules pourprées, très petites et sa couleur sombre. Par son port il rappelle le *Senecio vulgaris* L., avec des capitules plus gros et moins denses. Par la plupart de ses caractères il se rapprocherait des *S. gallicus* L. et *coronopifolius* Desf., dont il se distingue de suite par ses très petites ligules pourprées peu ou pas rayonnantes. Son style et ses étamines sont constitués comme dans le *S. coronopifolius*, toutefois l'appendice du connectif est plus long et plus étroit, et il en est de même du renflement du filet au-dessous de l'anthere.



**Senecio hoggariensis** Batt. et Trab.