

Cordia sinensis Lam.



Lbas

Synonymes : *Cordia gharaf* (Forssk.) Ehrenb. ex Asch.
Cordia oblongifolia Hochst. ex DC. (1845)
Cordia reticulata Roth (1821)
Cordia rothii Roem. & Schult. (1819)

Description : grand buisson (1 à 2 mètres de haut, voire plus). **Feuilles** oblongues, scabres. **Fleurs** petites, blanches réunies en cymes. **Fruits** : petites baies (environ 0,5 centimètre de diamètre) rouge orangé, suaves, comestibles.

Biogéographie : espèce de l'Afrique tropicale sèche. Présente aussi en Arabie et en Inde.

Type biomorphologique de Raunkier : nano-phanérophyte.

Port : grand buisson plus ou moins dense, déformé par le broutage des ruminants.

Préférences édaphiques : espèce des sols lourds.

Préférences hydriques : espèce mésophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : plante à la répartition sporadique, présente dans les dépressions sahéliennes ou dans les oueds, petits ou moyens, du Sahara où elle est beaucoup plus rare.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : susceptible de fournir abri et nourriture.

Références bibliographiques

Ozenda		Quézel & Santa	762	Barry & Celles	100	Nègre	
--------	--	----------------	-----	----------------	-----	-------	--



Aspect général.



Fruits.

