

### *Ogastemma pusillum* (Coss. & Durieu ex Bonnet & Barratte)



**Basionyme :** *Megastoma pusillum* Coss. & Durieu ex Bonnet & Barratte (1895)

**Synonyme :** *Eritrichium sventenii* Sunding (1977)

---

**Description :** petite plante annuelle (ordinairement moins de 35 centimètres de haut), très rameuse, d'aspect souvent grisâtre, entièrement ciliée (poils blancs plus ou moins raides). **Fleur** petite (2 à 3 millimètres de diamètre), blanche ou jaune, plus courte que le calice.

**Biogéographie :** espèce saharo-sindienne à nette tendance méditerranéenne.

**Type biomorphologique de Raunkier :** thérophyte.

**Port :** espèce annuelle, formant de petites touffes rameuses et denses, entièrement velue.

**Préférences édaphiques :** espèce eury-psammophile.

**Préférences hydriques :** espèce xérophile, voire hyper-xérophile.

**Tolérance aux sels :** non.

**Biotopes :** fréquente sur alluvions plus ou moins sablonneuses et/ou rocailleuses.

**Intérêt pour le Crique pèlerin :** plante susceptible de fournir nourriture mais constituant un mauvais abri car très souvent de petite taille.

#### Références bibliographiques

Ozenda	399	Quézel & Santa	775	Barry & Celles	101	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--



Plant en fin de végétation (tout début de dessèchement).



Plant en pleine végétation (floraison).



Détail de la fleur et de la pilosité.

