

*Anastatica hierochuntica* L.



Han

**Description** : plante formant de très petits buissons (5 à 35 centimètres de diamètre), étalés au sol. À maturité, les **feuilles** tombent et les rameaux se recroquevillent en se desséchant, formant une boule plus ou moins compacte, laquelle peut persister plusieurs années et est susceptible d'être transportée par le vent sur de grandes distances. Feuilles petites, ovales et duveteuses. **Fleurs** petites et blanches. Le **fruit** est une silique compacte (silicule) munie d'un bec central et de deux ailes latérales concaves.

**Biogéographie** : espèce saharo-sindienne à tendance méditerranéenne.

**Type biomorphologique de Raunkier** : thérophyte.

**Port** : herbe annuelle.

**Préférences édaphiques** : plante présente dans divers types de sols plus ou moins lourds, pouvant aussi être rocailleux.

**Préférences hydriques** : espèce tropo-xérophile.

**Tolérance aux sels** : non.

**Biotopes** : espèce des sols alluviaux, où elle peut être abondante. Également présente dans les bas de pente rocailleuse, où elle est beaucoup plus dispersée.

**Intérêt pour le Criquet pèlerin** : faible, bien que consommée.

Références bibliographiques

Ozenda	271	Quézel & Santa	408	Barry & Celles	109	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--



Petits individus : l'un ancien et mort, l'autre en début de floraison et de fructification. Leur petite taille souligne que les réserves en eau sont limitées dans ce biotope.



Plant de taille moyenne, en plein développement.



Individu en pleine floraison.



Début de fructification.



Individu en cours de dessèchement et se recroquevillant.



Vieux pied sec, mort depuis plus d'une année.

