

1401. **D. Berthautii** Br.-Bl. et Maire in B. et M., n° 18 (1922) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 283. — ①. Herbe verte, \pm poilue, 1-pluricaule ; racine grêle ou assez épaisse, pivotante. Tiges dressées, 30-80 cm long., pruneuses, très rameuses souvent dès la base, obtusément anguleuses, densément hispides inférieurement par des poils blanchâtres, rétrorses, 1-2 mm long., glabres supérieurement ; rameaux \pm dressés. Feuilles basales en rosette, à pétiole 3-4 cm long., à limbe ovale-lancéolé dans son contour, \pm densément hispides par des poils étalés ou \pm couchés, 1-1,5 mm long., vertes ou un peu grisâtres par l'indument, atteignant 14 cm long., pennatiséquées ou bipennatiséquées, à 5-7 paires de segments latéraux subégaux, distants de 8-12 mm, à divisions dentées ou entières ; rachis ailé, segment terminal égal aux autres. Feuilles caulinaires inférieures conformes, plus brièvement pétiolées, les su-

périeures bien plus petites, peu poilues ou glabres, pennatiséquées ou entières, à lanières entières ou peu dentées. Grappes corymbiformes à




FIG. 103. — *Diplotaxis Berthautii*.

l'anthèse, puis allongées, lâches, 30-70-flores, nues. Pédoncules florifères 8-11 mm long., glabres ; les fructifères non épaissis, filiformes, pouvant atteindre 26 mm long., étalés-dressés. Sépales étalés-dressés, oblongs, obtus, jaunes, c. 3 mm long., peu poilus ou glabres, étroite-

ment marginés de blanc, les internes un peu plus larges, souvent violacés inférieurement, légèrement sacciformes à la base. Pétales 6-6,5 mm long., sulfurin vif, paucinerviés, limbe largement obovale-arrondi, c. 3,5 mm larg., brusquement contracté en onglet c. 2,5 mm long. Etamines toutes dressées, les internes c. 4,5 mm long., les externes c. 3 mm long. ; filets jaunâtres ; anthères jaunes, oblongues, obtuses, c. 1,5 mm long. Nectaires médians ovoïdes ; nectaires latéraux déprimés, peu saillants. Gynécée glabre ; ovaire 40-60-ovulé ; style court, c. 0,8 mm long. ; stigmatte capité. Siliques dressées ou étalées-dressées, à gynophore très court (0,3-0,5 mm), très comprimées, 12-17 × 1,5-2 mm, linéaires-fusiformes, atténuées en rostre 3-3,5 mm long., non ou à peine contracté à la base, monosperme, comprimé, avec une seule nervure saillante sur chaque face ; valves submembraneuses, oblongues-linéaires ou oblongues-cunéiformes, jaune-verdâtre ou violacées, tronquées ou rétuses au sommet, avec une apophyse interne saillante, atténuées-obtusiuscules à la base, uninerviées par réflexion, à nervures latérales très grêles, flexueuses et anastomosées, visibles par transparence. Graines nettement bisériées, ovoïdes, comprimées, brunes, pendantes, lisses, c. 0,6 × 0,4 mm. Floraison : mars-mai.

Pâturages rocailleux, champs pierreux des régions semiarides et arides. — M. Haouz ; Monts Bani.