

Sect. II. *EREMOBIUM*. — Sepala lateralia saccata. Petala apice integra. *Siliqua* linearis vel siliculiformis, valde *compressa*, torulosa, cito dehiscens, stylo brevi vel subnullo. *Semina* suborbiculata, ovata vel oblonga, dorso convexa, ventre planiuscula, *late vel anguste marginata*, interdum immarginata. Radicula oblique subdorsalis rarius subcommissuralis.

Obs. Genus *Eremobium* a cl. Boissier (*Or.* I, 156) conditum non admittendum videtur, nempe notæ e forma siliquæ, textu septi, forma seminum, radiculæ situ depromptæ variabiles et a *Malcolmia* non recedunt.

6. M. Ægyptiaca Spreng. *Syst.* II, 898 [1825]; *Vis. Pl. Æg. ac Nub.* 25, t. 4, f. 2 [1836]; *Coss. Illustr. Atl.* I, 22, t. 15 et 16. — *Hesperis ramosissima* Delile *Æg.*

Illustr. n. 595 non Desf. — *H. diffusa* Dcne *Fl. Sin.* in *Ann. sc. nat.* sér. 2, III, 271 [1835]. — *Eremobium lineare* Boiss. *Or.* I, 157.

Planta annua a basi ramosa, vel quando in arena sepulta aut ab animalibus contrita indurato-suffruticosa per plurimos annos persistens ramos cauliformes herbaceos numerosos emittens; caulibus erectis, ascendentibus vel diffusis, plus minus cum foliis pube stellata molli tomentosis, interdum glabrescentibus viscidulis, quando induratis epidermide albida donatis; foliis sessilibus, linearibus vel lineari-oblongis obtusis, integris; racemis plurifloris demum laxis, interdum basi foliatis; pedicellis calyce brevioribus, demum modice incrassatis; floribus parvulis; *sepalis lateralibus saccatis*; *petalis* violaceis, calyce sesquolongioribus, anguste oblongis, *apice integris*; *siliquis* pedicello plus minus latioribus, linearibus, rarius lineari-oblongis vel siliculiformibus *valde compressis*, seminibus in quoque loculo pluribus vel plurimis rarius paucis, *valvis valde torulosis* inter semina incrassato-subseptuliferis, pube adpressa stellata plus minus tomentosis, rarius glabrescentibus, rectis, *cito dehiscentibus*, *stylo brevi vel subnullo* lamellis stigmatiferis in conum conniventibus, septo membranaceo subpellucido in lateribus tenuissime alveolatim reticulato medio fascia subopaca lata donato; *semnibus* oblongis, ovatis vel suborbiculatis, late membranaceo-marginatis, anguste *marginatis vel rarius immarginatis*. ① vel induratione ƒ.

Var. α . *linearis* Coss. *Illustr. Atl.* I, 22, t. 15, f. 1-15. — *Matthiola linearis* Delile *Fragm. Arab. petr.* 16, n. 56, f. 3. — Exs. Auch. *Arab. petr.* 124, Schimp. 239.

Planta sæpe pusilla, parce pubescenti-tomentosa vel glabrescens, sæpe viscidula; *calyce subpersistente* vel sero tantum deciduo; *siliquis pedicello multo* vel subtriplo *latioribus*, subsiliculiformibus, oblongo-linearibus vel linearibus, interdum glabrescentibus; *semnibus majusculis, suborbiculatis vel ovatis, sæpius late membranaceo-marginatis*; radícula commissurali vel vix obliqua. ①.

In ditioe floræ nostræ non visa.

In Ægypto media?; in Arabiæ deserto Sinaico et provincia *Haouara*.

Var. β . *Ægyptiaca* Coss. *Illustr. Atl.* I, 23, t. 15, f. 16-25. — *M. Ægyptiaca* Spreng., l. c.; Vis., l. c. — *Hesperis ramosissima* Delile!, l. c. — *Hesperis diffusa* Dcne!, l. c. — Exs. Sieb. *Æg.* sub *Cheiranthus lividus*, Wiest 541, Ky [1855] 403, Schweinf. 1333, Lx 7; Bové *Palæst.* 510; Bové *Arab. petr.* 134.

Planta plus minus pubescenti-tomentosa, haud viscidula, interdum induratione perennans; *calyce cito deciduo*, rarius subpersistente; *siliquis sæpius pedicello subduplo latioribus, linearibus, sæpius 15-25 millim. longis*, plus minus tomentosis; *semnibus mediocribus vel parvis, ovatis vel oblongis, anguste membranaceo-marginatis vel vix marginatis*; radícula obliqua *subdorsali*. ① vel induratione ƒ.

In ditione floræ nostræ non visa.

In deserto Libyco, Ægypto inferiore et media; Palæstina, Arabia petræa.

Var. γ . *longisiliqua* Coss. ap. Bourg. *Ers. Alg.* [1856], et *Illustr. Atl.* I, 23, t. 16. — Kral. in Bourg. *Alg.* 237.

Ar. حَمَى *H'ama* «calida» vel حَامَا *H'amaa* «cænosa» (Duveyr.); حَمْرَا *H'amra* «rubra» (Coss., Sériz., de Colomb, etc.); حَرَّة *H'arra* «calida, urens» (Larg.); رَفِيفَة *Reguiga* «tenuis» (Coss., Bertr.). — TUNAR. المروجيت *Almarougit* (Duveyr.).

Planta pubescenti-tomentosa, haud viscidula, caule sæpius indurato-suffruticoso per annos plures persistente et ramos cauliformes herbaceos numerosos emittente; calyce cito deciduo, rarissime subpersistente; *siliquis pedicello sæpius subduplo latoribus, linearibus elongatis, sæpius 3-5 centim. longis, tomentosis; seminibus mediocribus, oblongis, anguste membranaceo-marginatis; radícula obliqua subdorsali.* ① vel induratione 2 Dec.-Jun.

In aggeribus arenæ mobilis, in alluviis et alveis arenosis, in regione Saharensi et Planitiebus excelsis calidioribus contiguis — **Plan.** A²: in ditione *Zahrès* (Reb.), *Daïa Grar-el-Ahmra* (Soll.). — O³: *Dj. Itima, Gada-Enfous* (Rx), *Khaneg El-Melah!*, *Aïn-ben-Khelil!*, *Magroun* (War.) *Taoussera!*, *Leumbah!*. — **Sah.** C⁸. — A⁸. — O⁶. — **TUN.** *Gour Arceï-Eccheub*, *Dj. Bou-Hedma* (Doûm.), *Gafsa* (Doûm., J. Reb.), *Gouïfla, El-Hamma* (Djerid), *Tozzer* (Doûm. et Bonn. miss. 1884), *Tozzer, Nefta* (André), inter *Fratis* et *Limaguès, Kebilli, Oued Zitoun, Dj. Cherb* (Lx miss. 1884.) — **MAR.** *Teniet Mouissifer* (War.).

Ad *Ghadamès* (Larg.), in planitie *Tasili* ditionis *Touareg* (Duveyr.).

OBS. *M. Ægyptiaca* mire variat duratione, indumento, calyce cito vel sero deciduo, siliquis oblongo-linearibus vel linearibus brevibus interdum siliculiformibus aut longissimis, seminibus majusculis, mediocribus parvisve, suborbiculatis, ovatis vel oblongis, late, anguste vel vix marginatis, radícula obliqua subdorsali vel subcommisurali. E speciminibus numerosis rite examinatis patuit varietatem nostram *longisiliquam*, mediante varietate *Ægyptiaca*, a varietate *lineari* non specificè distinguendam ut opinatur cl. Boissier.