

Farsetia stylosa R. Br.



Lbas

Synonymes : *Farsetia depressa* Kotschy
Farsetia hamiltonii Royle
Farsetia ramosissima Hochst. ex E. Fourn.

Description : petit buisson atteignant 45 centimètres de haut, formant des touffes petites ou moyennes, ordinairement peu denses. **Tiges** et **feuilles** couvertes de poils courts blanchâtres. Feuilles linéaires (3 x 30 millimètres). **Fleurs** petites (moins de 5 millimètres) blanches ou plus ou moins rosées. Le **fruit** est une silique 3 à 4 fois plus longue que large ; les **graines** sont ailées (marge scarieuse) et disposées sur 2 rangs dans chaque valve de la silique.

Biogéographie : espèce saharo-sindienne.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte.

Port : herbe annuelle formant de petits buissons bas, rarement denses.

Préférences édaphiques : espèce des sables plus ou moins limoneux.

Préférences hydriques : espèce xérophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : espèce très commune des steppes et des pelouses, sur sols plus ou moins sableux.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : faible. Peut offrir ponctuellement un abri aux larves.

Espèce voisine : *Farsetia occidentalis* B. L. Burtt. Les siliques sont plus allongées (5 à 8 fois plus longues que larges). Cette espèce vivace forme des buissons moyens assez ramifiés, atteignant 80 centimètres de haut, que l'on rencontre çà et là dans le Nord-ouest saharien.

Références bibliographiques

Ozenda	259	Quézel & Santa	397	Barry & Celles	111	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--



Touffe âgée.



Fleurs.



Fruits : siliques complètes.



Fruits : siliques ouvertes ayant perdu leur cloison latérale. Il reste la cloison centrale et quelques graines ailées.



Espèce voisine : *Farsetia occidentalis*. Individu de petite taille mutilé par le pâturage.



Espèce voisine : *Farsetia occidentalis*. Siliques longues munies d'un bec, inflorescence pauciforme (moins de 10 fleurs ou fruits).

