

16. HENOPHYTON.

Henophyton Coss. et DR. (prius *Henonia*) in *Bull. Soc. bot.* II, 246 et 625, et in *Ann. sc. nat.* sér. 5, I, 279, t. 22; Walp. *Ann.* IV, 216; Benth. et Hook. *Gen.* I, 85; Coss. *Illustr. Atl.* I, 37. — *Oudneya* R. Br. *Obs. pl. Oudn.* 14 [1826] imperfecte descripta et synonymo Vivianiano (ad *Moricandiam* pertinente) excludendo.

Sepala erecta, lateralia basi saccata. Petala unguiculata ungue lato, limbo integro. Stamina libera, exappendiculata. *Siliqua late linearis*, saepe inter semina irregulariter sinuato-contracta vel strangulata, *complanata*, dehiscentia, *valvis* planis *nervo medio valido et venis lateralibus anastomosantibus donatis*, septo membranaceo; stigmate bilobo lobis in conum conniventibus. *Semina* in quoque loculo 8-15 rarius pauciora, *uniseriata*, ovato-suborbicularia, *compressa*, *latissime membranaceo-alata*. *Cotyledones* conduplicatae, apice emarginatae.

Frutex habitu Farsetias nonnullas longisiliquas referens, glaberrimus, ramosus. Folia oblonga vel linearis-oblonga, integra vel rarius sinuata. Flores purpureo-violacei.

Obs. Genus hoc siliquæ et seminum forma eximum cl. Hénon nuper interpreti militari, sedulo peritissimoque floræ provinciæ Cirtensis præsertim australis perscrutatori, lubentissimo animo dicatum voluimus. — *Henophyton* siliqua elongata dehiscente, haud articulata, cotyledonibus conduplicatis ad Brassiceas pertinet, ubi juxta *Moricandiam* DC. et *Euzomodendron* Coss. (ap. Webb *Ot. Hisp.* 47, t. 43, et *Pl. crit.* 144; Benth. et Hook. *Gen.* I, 85) collocandum. — A *Moricandia* differt habitu peculiari, petalorum ungue lato, siliqua late linearis complanata Farsetias nonnullas referente, non linearis angusta subtetragono-compressa vel compressa, et seminibus latissime membranaceo-alatis, non immarginatis vel vix marginatis. — Seminibus latissime membranaceo-alatis *Euzomodendro* propior; ab eo differt petalorum ungue lato, staminibus longioribus liberis, non per paria coalitis, siliqua late linearis complanata valvis planis membranaceis uninerviis, non oblongo-lanceolata compressiuscula valvis convexis crassis coriaceis nervis 5 rectis æquilibus donatis. — E speciminibus collectionis Oudneyanæ nunc in herbario *British Museum* asservatæ, quam anno 1871 in hoc herbario examinare non licuit, cl. doctor Trimen (*Journ. Bot.* XVII, 126) asserit *Henophyton deserti* et *Oudneyam Africana* unicum speciem constituere; attamen nomen *Henophyton* anteferendum videtur, nempe R. Brown, in descriptione breviore et imperfecta, tanquam synonymon *Hesperidis nitentis* Viv. (*Libyc.* 38, t. 5, f. 3), quæ ex herbario Vivianiano ad *Moricandiam arvensen* var. *suffruticosam* pertinet, *Oudneyam* indicat.

1. *H. deserti* Coss. et DR. ap. Coss. in *Bull. Soc. bot.*, l. c., et in *Ann. sc. nat.*, l. c., et *Illustr. Atl.* I, 38, t. 27. — *Oudneya Africana* R. Br., l. c. synonymo Vivianiano excludendo. — Exs. Kral. *Alg.* 15 et bis, Choul. sér. 2, 306.

An. علقة، علقة *Alga*, *Eulga* «pabulum gratum» (Coss., Duveyr., Sériz., Larg., etc.); حنّة *H'enna* «nomen Lawsoniae»; حنّة *H'ennat-el-Djemal*

«Cyprus seu Lawsonia camelorum» (Larg.); *H'omim* ^{جَمِيعٌ} «planta crescens in desertis» (Coss.); *Kerkas* (Aschers.). — *TOUAR*. ^{الْقَوْمُ} *Allegomo* (Duveyr.).

Frutex dumosus, ramis adultis cortice cinereo rimoso, hornotinis cortice lævi demum albescente; foliis crassiusculis carnulosis, oblongis vel linearis-oblongis rarissime oblongo-cuneatis, obtusis, inferne sensim attenuatis, integris, rarius subsinuatis, rarissime dentato-subpinnatifidis; floribus majusculis, in racemos plurifloros rarius 3-5-floros dispositis, pedicellis calyceis subæquantibus; petalis calyce subduplo longioribus, ungue albido, limbo purpureo-violaceo; racemis fructiferis rigidis, saepius abortu florum superiorum abbreviatis; siliquis basi et apice plus minus attenuatis vel subrotundatis, valvis submembranaceis nitidis nervo medio et venis anastomosantibus donatis, stylo aspermo latitudine valvarum æquante vel breviore; seminum alis tenuissime membranaceis hyalinis sese invicem obtegentibus. ♂. A primo vere et saepius per totam hiemem usque ad æstatem floriferum et fructiferum.

In collibus calcareis apricis, in pascuis et depressis argillosis, in alluviis et alveis, quandoque adeo copiosum et induratum ut ejus lignum culinæ inserviat. — **Sah.** Tantum in ditionibus australioribus. C⁸: ex. gr.: *Coudiat-el-Dohr!* (Mil.), *Ourlana!*, *Oued Retem* prope *Zioua* (Hén. [1853]), *El-Alia* (Reb.), *Guemar!*, *El-Oued* (Reb.), *Temacin* (Mil.), *El-Hadjira!* (d'Halmont), *Beresof* (Larg.), *Oued Issoued* (Dourn.-Dup.), etc. — A⁸: ex. gr.: *Oued Zegrir!* (Reb.), *Guerrara!* (Reb.), *Daïa Feïla!*, *Ghar-el-Debah!*, *Ngoussa* (Reb.), *El-Ateuf!*, *Ghardaïa!* (Reb., Par., Vilm.), *Oued Neumrat!* copiosissimum et alte frutescens, *Metlili!*, *Hassi Cherf*, inter *Hassi Zirara* et *El-Golea* (Mil.), ad meridiem *Ouargla* ad *Gour El-Beugra* (Lx), ad *Hassi Tarfaïa* (Lalanne), *Hassi Tamesguida* (Chenu), *Aïn Taïbia* (Iss.), etc. — Desideratur in provincia Oranensi.

Ad *Ghadamès* (Larg.), in deserto Tripolitano inter *Tripoli* et *Mourzouk* (Oudney), in palmeto *Djofra* ditionis *Sokna* (Rohlfss).

