

9. MORETTIA.

Morettia DC. *Syst. II*, 426, et *Prodr. I*, 185; Endl. *Gen. n. 4894*; Benth. et Hook. *Gen. I*, 70; Boiss. *Or. I*, 145.

Sepala erecta, lateralia haud saccata. Petala oblongo-linearia, unguiculata. *Siliqua linearis, teretiuscula vel subtetragono-compressa, valvis convexis rigidis nervosis, intus inter semina incrassato-septuliferis, serius secedentibus; septo membranaceo opaco; stigmate bilobo lobis conniventibus divergentibusve. Semina plura, uniseriata, compressa, immarginata. Cotyledones plano-convexæ, radiculæ accumbentes.*

Plantæ pilis stellatis hispidæ vel cano-tomentosæ. Flores albi.

1. M. canescens Boiss. *Diagn. Or. ser. I, VIII, 17*, et *Or. I, 145*; Coss. *Illustr. Atl. I, 21, t. 14*. — *M. Nakkebiana* Hochst.! in sched. manuscr. pl. Arab. Schimp. ed. 2. — Forma parviflora, petalis brevioribus calycem vix excedentibus, siliquis arcuatis, stigmatis lobis etiam demum conniventibus: *M. parviflora* Boiss. in *Ann. sc. nat. [1842] 60*, et *Or. I, 146*. — *M. minor* Hochst.! in sched. manuscr. pl. Arab. Schimp. ed. 2. — Exs. Kral. in Bourg. *Alg. 241*; Schimp. *Arab. petr. 341*, Bové (*Sinai*) 141, Auch. 136; Auch. *Mascate 4076*.

Planta perennis, cano-tomentosa pube stellata adpressa radiis subæqualibus, tactu scabrida; caulis diffusis vel prostratis, rarius ascendentibus, superne ramosis; foliis ovato-oblongis vel oblongis, in petiolum brevem attenuatis, integris vel repando-dentatis; floribus ad apicem racemi basi foliati cito elongati subcorymboso-confertis, pedicellis calyce saepius brevioribus; calyce cito deciduo, sepalis oblongis obtusis; petalis calyce sessilis longioribus vel vix longioribus; glandulis hypogynis valvarii parum præminentibus; siliquis calyce multo longioribus, in racemos demum longiusculos dispositis, in pedicello crasso erecto-subadpressis, rectis vel plus minus arcuatis, stigmatis lobis divergentibus vel divaricatis rarius erectis conniventibus. *2. Mart.-Jun.*

In ruderatis, in argilloso-calcareis vel arenosis, in glareosis, tantum in regione Saharensi provinciae Oranensis. — **Sah.** O³: inter *Arba-Tahtani* et *El-Abiod-Sidi-Cheikh!*, *Bou-Semghoun*, in valle *Oued Som*, *Moghar-Tahtani* (War.), *Tyout!* (War.), inter *Tyout* et *Aïn-Sefra!*, *Aïn-Sefra!*; in valle *Oued Benout* ad *Mengoub* (Par.) et *Kef El-Fokra* (War.). — **MAR.** Inter *Toumiet* et *Figuig* (War.); ad palmetum *Akka* (Mard.).

In desertis Arabiæ petrææ et ad *Mascate*.

Obs. *M. canescens* differt a *M. Philæana* DC. (*Syst. II*, 426, et *Prodr. I*, 185; Boiss. *Or. I*, 145. — *Sinapis Philæana* Delile! *Ég. 99*, t. 33, f. 3. — *M. asperrima* Boiss. in *Ann. sc. nat. [1842] 60*. — Exs. Sieb. *Äg.*; Ky Nub. 363, Lx 220; Auch. *Mascate 4102*), in deserto Ägyptiaco-Arabico, in Nubia et ditione *Mascate* crescente, caulis diffusis vel prostratis, non robustis ascendentibus erectis subdichotome ramosis, pube adpressa radiis subæqualibus cano-tomentosa et tactu scabrida, non radiis inæqualibus longioribus patentibus setiformibus exasperata, floribus 4-6-plo minoribus, in racemos plurifloros dispositis, non ad ramificationum angulos solitariis et in racemos 4-8-floros oppositifolios dispositis, calyce cito deciduo sepalis oblongis obtusis, non post anthesim accrescente et tantum paulo ante siliquarum maturationem secedente sepalis lanceolatis acutiusculis, glandulis hypogynis valvarii parum non valde præminentibus, siliqua calyce multo non sesqui-vel subduplo longiore.