

229. Moricandia DC. *

Herbes ou sous-arbrisseaux, glabres. F. \pm charnues, simples, entières ou peu divisées, pourvues ou non de faisceaux foliaires axillaires. Sép. dressés, les externes linéaires, les internes oblongs. Pét. violacés, purpurins ou lilacins, densément veinés, atténués à la base en onglet subfiliforme. Nectaires médians absents, les latéraux déprimés, en croissant. Silique linéaire, comprimée ; valves obtuses à nervure médiane assez épaisse et saillante ; rostre asperme. Graines petites, lisses, svt étroitement ailées à la base et au sommet, nombreuses, 1-2-sériées.

- 1 - F. basales en rosette persistante à l'anthèse, oblongues, à marge sinuée, crénelée ou lobée. Boutons floraux apiculés par les sép. externes cornus. Pét. purpurins, longs de (1,5)2-3 cm. Fausse cloison de la silique fortement plissée.

~~●A **896. M. foleyi** Batt. = *Eruca foleyi*~~

~~Pl. ann. fortement odorante, robuste, svt rameuse dès la base, atteignant 1,5 m de haut. Racine pivotante, très puissante. Grappe assez dense et corymbiforme à l'anthèse puis très allongée. Sép. longs de 7-9 mm, verts ou rougeâtres. Th - P - Alluvions limoneuses et sablonneuses des régions désertiques - S - Ms (o. Ziz près de Mfis, Bou-Tarirt au SE de Taouz (GUINET & SAUVAGE, 1954)).~~

- 1'- F. basales non en rosette, obovales, larges, entières ou subentières. Boutons non apiculés ; sép. non cornus. Pét. ordinairement lilacins, longs de 1,2-2 cm. Fausse cloison non plissée. Pl. ann. ou vivace, glauque. **M. gr. arvensis**.....2
- 2 - Graines bisériées. Pl. herbacée presque tjrs annuelle.

897. M. arvensis (L.) DC.

F. caulinaires amplexicaules. Th (?Hém) - P E (A) - Plaines, basses (moy.) montagnes - S A SAd - Tout le Maroc.

- 2'- Graines unisériées. Pl. vivace ordinairement suffrutescente ou frutescente.....3
- 3 - Grappe multiflore, corymbiforme à l'anthèse.

898. M. suffruticosa (Desf.) Cosson & Durieu

= *M. arvensis* subsp. *suffruticosa* (Desf.) Maire

Rameaux portant à leur base une écorce blanche, lisse. Ch - P E (A) - Plaines, basses et moy. montagnes - S A SAd SAd - Tout le pays, surtout le Sud et l'Est.

- 3'- Grappe pauciflore, lâche et non corymbiforme à l'anthèse.

899. M. nitens (Viv.) E. A. Durand & Barratte

= *M. arvensis* subsp. *nitens* (Viv.) Maire

F. assez denses, petites, entières ; les caulinaires atténuées à la base, la plupart non amplexicaules (les sup. seules un peu cordées ou semi-amplexicaules). Pét. 1,2-1,5 cm, purpurins ou violacés, à limbe étroitement obovale. Silique 3-6 cm x 1,2-1,5 mm. 2n = 28 (ARISTA & ORTIZ, 1994). ?Ch - Op (entre Taza et Âïn Bou-Kellal à 141 km d'Al Hoceïma (ibid) ; à confirmer.

* Par M. Fennane