

Herb. Boiss. n. 18, p. 67 (1900) var. *livida* Conti l. c. = *M. livida* DC. *Syst.* II, 174 (1821).

Hab. : Oran, monuments préhistoriques dans la plaine rocheuse près d'Aïn Sefra, alt. ca. 1050 m. 18 mai (n. 287).

Var. *oasicola* Hochr., var. nov. — Ab omnibus varietatibus a Conti enumeratis differt caulibus glandulosis sed pilis omnino destitutis, nisi in apice ramorum juxta alabastra. Tota planta viridis, folia lanceolata vel linearia, interdum paulum sinuata, glandulosa et minute pilosa.

Hab. : Oran, Tircount, point d'eau dans le Faidjet-el-Betoum. dans le sable humide sous les lauriers roses, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 441).

Obs. — Cette plante est évidemment une forme particulière du *M. oxyceras* qui se trouve dans le steppe, mais c'est une forme profondément modifiée par le milieu. Au lieu de la plante chétive pourvue de quelques tiges florales grisâtres avec quelques fleurs très pâles, c'est une énorme touffe, formée d'un grand nombre de tiges et portant d'innombrables fleurs d'un beau violet. Nous n'avons pas vu de formes précisément intermédiaires, mais comme les modifications ne portent que sur des caractères variables dans cette espèce, nous sommes persuadé qu'il n'y a là qu'une variété.

On peut rapprocher cette plante du *M. pseudooxyceras* var. *viridis* Conti l. c. p. 72, mais la description très sommaire empêche une identification. Toutefois les filets des longues étamines sont fortement élargis ce qui est caractéristique, selon Conti, pour le *M. oxyceras*. Nous doutons de la valeur de ce caractère comme d'ailleurs de celle de l'espèce de Conti.

MORICANDIA DC.

M. arvensis DC. *Syst.* II, 626 var. *suffruticosa* Coss. *Comp.* II, 157 = *M. suffruticosa* Coss. et Dur. in *Ann. sc. nat.* ser. 4, IV, 282 = *Brassica suffruticosa* Desf. *Fl. atl.* II, 94.

Hab. : Oran, en montant d'Aïn Sefra à Ras Chergui, dans les pentes de rochers, répandue entre 1100 et 1500 m. d'altitude. 16 mai (n. 203).

Obs. — Cette plante offre tant de termes de passage vers le *M. arvensis* que l'on ne saurait la regarder comme une espèce particulière, néanmoins ses siliques très longues et très étroites,

ses feuilles plus petites et ses tiges ligneuses en font une variété facile à distinguer et caractéristique pour la région. Nous ne parlons pas des graines uni ou bisériées dans chaque loge, car ce caractère nous a paru inutile à mentionner à cause de son inconstance.

C'est à tort que cette sous-espèce est attribuée à DC. par Battandier et Tr. (*Fl. Alg.* I, 64). DC. avait déjà reconnu, il est vrai, que le *Brassica suffruticosa* Desf. était une variété du *M. arvensis* DC., mais il avait gardé la dénomination *B. suffr.* C'est Cosson qui, le premier, a établi une nomenclature admissible.

CAPPARIDACEÆ

CLEOME L.

C. arabica L. *Amoen. acad.* IV, 281.

Hab. : Oran, Aïn Sefra, sable de la dune, alt. ca. 1050 m.
14 mai (n. 192).

RESEDACEÆ

RANDONIA Cosson

R. africana Cosson in Kralik *Pl. alg. exsicc.* n. 19 (1858) et in *Bull. soc. bot. Fr.* VI, 392 (1859).

Hab. : Oran, steppe sablonneux dans le Faidjet el Betoum, à environ 15 km. d'Aïn Sefra. 24 mai (n. 419).

RESEDA L.

R. alba L. *Sp. pl.* 449 var. *lætevirens* J. Müll. arg. *Monogr. Resed.* 101 (1857) α *vulgaris* J. Müll. l. c. 102.

Hab. : Environs d'Alger, Fort de l'Eau, 2 mai (n. 85); Oran, Saïda, dans une haie, alt. ca. 850 m. 10 mai (n. 104).

Var. *firma* J. Müll. arg. l. c., p. 104, α *major* J. Müll. l. c.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers buissonneux, alt. ca. 1900 m. 19 mai (n. 370).

Obs. — Nous ne saurions décider quel est le nom prior qui doit être appliqué à ces variétés, à cause de la synonymie si compliquée de ces formes. Après la plupart des noms cités par Müller