

Paronychia arabica (L.) DC. var. *arabica*



Hviv

Basionyme : *Illecebrum arabicum* L. (1767)

Synonymes : *Herniaria lenticulata* Forssk. (1775)
Paronychia arabica (L.) DC. (1804)
Paronychia desertorum Boiss. (1843)
Paronychia longiseta Webb & Berthel.

Description : plante rampante. **Tiges** raides. **Feuilles** opposées stipulées (stipules scarieuses).
Inflorescences capitées d'aspect plus ou moins argenté en raison des bractées scarieuses.
Sépales terminés par une courte pointe.

Biogéographie : espèce saharo-sindienne à préférences méditerranéennes.

Type biomorphologique de Raunkier : hémicryptophyte.

Port : espèce vivace se comportant le plus souvent en annuelle. Port souvent rampant étalé sous l'influence du pâturage.

Préférences édaphiques : espèce eury-psammophile et saxicole.

Préférences hydriques : espèce xérophile et résistante à la sécheresse.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : espèce des pelouses colonisant les dépressions et présente dans les pentes rocailleuses.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : peu d'intérêt.

Références bibliographiques

Ozenda	209	Quézel & Santa	318	Barry & Celles	130	Nègre	I-205
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	-------



Aspect général.



Début de floraison.



Pleine floraison.



Rosissement en fin de cycle.

