

Polycarpon robbairea Kuntze



Han

Synonymes : *Polycarpaea confusa* Maire (1949)
Polycarpaea prostrata Decne.
Polycarpaea robbairea (Kuntze) Greuter & Burdet (1982)
Polycarpon delileanum (Milne-Redh.) Monod
Robbairea confusa Maire (1950)
Robbairea delileana Milne-Redh. (1949)
Robbairea major (Asch. & Schweinf.) Botsch. (1964)
Robbairea prostrata (Asch. & Schweinf.) Botsch.

Description : plante rampante ou semi-érigée. **Tige** à ramification dichotomique. **Feuilles** petites, opposées et stipulées. Nervure des stipules ou des bractées colorée. **Fleurs** roses bien visibles (environ 3 millimètres), pétales ongiculés (rétrécis à la base).

Biogéographie : espèce saharo-sindienne dont les préférences tropicales restent à vérifier.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte.

Port : herbe annuelle.

Préférences édaphiques : espèce des sols sablo-limoneux, voire graveleux.

Préférences hydriques : espèce eury-xérophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : espèce fréquente des pelouses colonisant les dépressions et les zones alluviales.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : espèce sans intérêt. Aucune possibilité d'abri et médiocre nourriture.

Espèce voisine : *Polycarpaea repens* (Forssk.) Asch. & Schweinf. se distingue par des tiges fragiles, des fleurs blanches, petites (moins de 2,5 millimètres) et des feuilles formant des pseudo-verticilles.

Références bibliographiques

Ozenda	210	Quézel & Santa	321	Barry & Celles	132	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--



Individu en plein développement (environ 30 cm de diamètre).



Pétales rétrécis à la base, bien visibles.



Fleurs.



Port semi-érigé, fréquent chez les jeunes individus.

