

Afrique du N. et au Maroc s'en trouve modifiée et doit s'établir comme suit :

subsp. **angustata** (Clavaud) Kerguélen & Lambinon, in *Nouv. Fl. Belgique, Luxembourg Rég. vois.* éd. 4 : 988 (1992).

≡ *S. marginata* var. *angustata* Clavaud in *Actes Soc. Linn. Bordeaux* 35 : 401 (1882). [basion.] *Fl. Afr. N.* 9 : 107.

≡ *S. marginata* subsp. *angustata* (Clavaud) P. Monnier

≡ *S. maritima* subsp. *angustata* (Clavaud) Greuter & Burdet *MCL.* 1 : 283

? **Maroc**

Normalement absent de la Flore nord-africaine où il serait remplacé par le subsp. *occidentalis* sur les rivages océaniques. Cependant Monnier (1953 : 81) laisse en suspens la question de la présence possible de ce taxon au Maroc d'après un exsic. de Sauvage de Mogador (Essaouira). Pour le moment, ce problème n'est pas résolu.

subsp. **intermedia** (Maire) Lambinon & Dobignard **comb. nova**

≡ *S. marginata* var. *intermedia* Maire in *Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. N.* 26 : 191 (1935). [basion.] *Cat.* 4 : 982.

≡ *S. marginata* subsp. *intermedia* (Maire) P. Monnier

≡ *S. maritima* subsp. *intermedia* (Maire) Greuter & Burdet. *MCL* 1 : 283; *Fl. Prat. Maroc* 1 : 199.

Maroc + Sahara occid.

Uniquement connu de l'embouchure de l'O. Sous jusqu'à présent. Récolté au Sahara occid. dans les sables maritimes à chénopodiacées à 100 km SW de Layoune (04.1989, AD6750).

subsp. **media**

= *S. maritima* auct. pl. = *S. marginata* subsp. *marginata* auct. pl.

= *S. marginata* subsp. *vulgaris* auct. *Afr. N. Fl. Afr. N.* 9 : 107.

N Maroc, ? (N) Algérie, ? Tunisie

La présence de ce taxon au Maroc et plus particulièrement dans la région tellienne ou encore dans les dépressions ± halophiles des hauts-plateaux de la frontière algérienne et même du Haouz-Tadla (zones où le subsp. *sauvagei* est dominant) n'est pas totalement exclue. Considéré comme appartenant aux rivages côtiers nord-méditerranéens (Monnier, 1975), serait donc absent du Maroc. Taxon auquel ont été rattachées traditionnellement les formes nettement vivaces et qu'il est parfois bien difficile de séparer du subsp. *sauvagei* P. Monnier à hétérocarpie inconstante. Si difficile que nous conservons quand même la subsp.-type pour le Maroc, en qualité d'adventice, au moins pour les zones perturbées et rudéralisées ± halophiles.

subsp. **occidentalis** (P. Monnier) Lambinon & Dobignard **comb. nova**

≡ *S. maritima* subsp. *occidentalis* P. Monnier In *Med-Checklist notulae* 8, *Willdenowia* 13 : 282 (1984). [basion.] *MCL* 1 : 284. *Fl. Prat. Maroc* 1 : 199.

Spergularia (Pers.) J. Presl & C. Presl

Spergularia media (L.) C. Presl, *Fl. Sicul.*: 161 (1826)

≡ *Arenaria media* L., *Sp. Pl.*, ed. 2 : 606 (1762). [basion.]

= *Spergularia maritima* (All.) Chiov. *Fl. Prat. Maroc* 1 : 199.

= *S. marginata* auct. pl. *Fl. Afr. N.* 9 : 105.

En accord avec *Fl. Eur.* ed. 2, 1 : 187 (1993) ; Rater in *Fl. Iberica* 2 : 154 (1990), Lambinon *et al.* (*Nouv. Fl. Belgique...* 4^{ème} éd. : 988, 1992) et Kerguélen (*in Index syn. Fl. France* : 175. 1993, version inform. 1999) qui réhabilitent le binôme linnéen et donnent la préférence à *S. media* sur *S. maritima* et *S. marginata*, la nomenclature des taxons présents en

subsp. **sauvagei** (P. Monnier) Lambinon & Dobignard **comb. nova**

≡ *S. maritima* subsp. *sauvagei* P. Monnier in Med-Checklist notulae 8, *Willdenowia* 13 : 282 (1984). [basion.] *MCL* 1 : 284. *Fl. Prat. Maroc* 1 : 199.

≡ *S. marginata* subsp. *sauvagei* P. Monnier in *Candollea* 30 : 152 (1975) [nom. inval.].

Souvent confondu avec le subsp. *media* (= *S. maritima* auct. pl., voir plus haut), qu'il remplace au Maroc et en Afrique du Nord en milieux primaires ou peu perturbés, dans les dépressions et lits d'oueds ± halophiles des zones arides de l'intérieur, Haouz, Haute-Moulouya, plaine d'Oujda, Hauts-plateaux orientaux au pied de l'Atlas saharien (Iche).

subsp. **tunetana** (Maire) Lambinon & Dobignard **comb. nova**

≡ *Spergula tunetana* Maire in *Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. N.* 32 : 205 (1941). [basion.]

≡ *S. marginata* subsp. *tunetana* (Maire) P. Monnier

≡ *S. maritima* (All.) Chiov. subsp. *tunetana* (Maire) Greuter & Burdet. *MCL* 1 : 284.

A. Dobignard et J. Lambinon

Littérature :

Monnier P., 1953 - Sur quelques spergulaires du Maroc appartenant au groupe *Spergula marginata* (DC.) Murb. *Recueil Trav. Lab. Bot. Fac. Sci. Univ. Montpellier*, sér. Bot. **6** : 78-88.

Monnier P., 1968 - Synopsis du genre *Spergularia* (Pers.) Presl au Maroc. *Natur. Monspel.*, Sér. Bot. **19** : 87-113.

Monnier P., 1975 - Systématique et biosystématique du genre *Spergularia* dans le bassin méditerranéen occidental (essai de taxinomie synthétique). 1. Série du *Spergularia marginata* (DC.) Kittel (= groupe *Pterospermae*). *Candollea* **30** : 121-155.