

Helianthemum lippii (L.) Dum. Cours.



Lbas

Basionyme : *Cistus lippii* L. (1771)

Synonymes : *Cistus sessiliflorus* Desf. (1798)

Helianthemum lippii var. *angustifolium* Willk. (1861)

Helianthemum lippii var. *intricatum* Murb. (1897)

Helianthemum lippii var. *marmaricum* Bég. & Vacc. (1913)

Helianthemum lippii var. *sessiliflorum* (Desf.) Spach (1836)

Helianthemum lippii var. *velutinum* (Pomel) Murb.

Helianthemum sessiliflorum (Desf.) Pers. (1806)

Helianthemum velutinum Pomel (1875)

Description : buisson vivace très polymorphe, atteignant 25 à 100 centimètres de haut. **Feuilles** plus ou moins linéaires, d'un vert argenté. **Fleurs** petites (moins de 1 centimètre de diamètre), pentamères, jaune franc. Lors de la fructification, présence de 3 sépales velus, aussi longs que larges, en étoile. **Fruit** : capsule déhiscente en 3 valves.

Biogéographie : espèce saharo-sindienne à nette tendance méditerranéenne.

Type biomorphologique de Raunkier : chamaephyte.

Port : espèce formant des buissons plus ou moins denses ou diffus.

Préférences édaphiques : espèce saxicole et psammophile.

Préférences hydriques : espèce xéroophile et résistante à la sécheresse.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : espèce des pelouses rocailleuses du Sahara septentrional et central, que l'on retrouve également dans les oueds.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : présente peu d'intérêt mais est ordinairement indicatrice de biotopes peu favorables.

Espèces voisines : d'autres *Helianthemum* existent au Sahara septentrional mais avec des distributions plus localisées.

Références bibliographiques

Ozenda	353	Quézel & Santa	714	Barry & Celles	151	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--



Touffe buissonneuse.



Feuilles, fleurs et fruits.



Fruits.



Jeune touffe en fructification, port assez diffus.

