

Cleome brachycarpa Vahl ex DC.



Han

Description : espèce formant de petites touffes de tiges denses et érigées pouvant atteindre 30 centimètres de haut et près de 50 centimètres de diamètre. Les **fleurs** sont moyennes (4-6 millimètres), jaunes et bien visibles. Les **fruits** sont de petites fausses siliques érigées (6-10 x 2-3 millimètres) et munies d'un bec allongé filiforme.

Biogéographie : espèce saharo-sindienne à préférences tropicales.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte, exceptionnellement chamaephyte.

Port : espèce annuelle pouvant prolonger son cycle une deuxième année si les conditions restent favorables.

Préférences édaphiques : espèce des sols limoneux plus ou moins sableux ou argileux.

Préférences hydriques : espèce tropo-xérophile.

Tolérance aux sels : espèce non ou très peu tolérante.

Biotopes : espèce formant des faciès dans les dépressions humides (flaques), voire temporairement inondables (mares temporaires).

Intérêt pour le Criquet pèlerin : peut offrir abri et nourriture.

Références bibliographiques

Ozenda	247	Quézel & Santa	386	Barry & Celles	120	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--



Jeune plant en fleur et début de fructification.



Feuilles tri- ou pentafoiliolées à la base.



Fausse silique dressée, prolongée par le style formant un bec filiforme.



Dépression interdunaire abritant un faciès peu dense de *Cleome brachycarpa*.

