

Crotalaria saharae Coss.



Lbas

Description : plante sub-ligneuse, pouvant former de petits buissons de moins de 60 centimètres de haut. Très velue, de couleur vert grisâtre. **Feuilles** digitées à (3)-5-7 folioles. **Fleurs** jaunes virant au rouge brun en fanant, disposées en longues grappes terminales denses (15-20 centimètres).
Fruits : gousses globuleuses couvertes de poils blancs.

Biogéographie : espèce endémique saharienne.

Type biomorphologique de Raunkier : petit chamaephyte se comportant souvent en thérophyte.

Port : plante le plus souvent annuelle, sub-ligneuse et pouvant former de petits buissons.

Préférences édaphiques : espèce psammophile et plus ou moins saxicole.

Préférences hydriques : espèce hyper-xérophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : plantes des pelouses psammophiles sahariennes. On la trouve également dans les lits d'oued.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : susceptible de fournir abri et nourriture dans des biotopes de survie ou de reproduction.

Espèces voisines : *Crotalaria arenaria* Benth., espèce annuelle des régions saharo-sahéliennes, se distingue principalement par ses feuilles unifoliolées (plus ou moins elliptiques) et par un port plus flexueux.

Crotalaria podocarpa DC., autre espèce annuelle des régions saharo-sahéliennes, se distingue par ses feuilles trifoliolées vertes, ses stipules foliacées et ses gousses plus longues que larges et sub-glabres.

Références bibliographiques

Ozenda	288	Quézel & Santa	476	Barry & Celles	232	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--



Individu de taille moyenne.



Espèce voisine : *Crotalaria arenaria*.



Individu en fin de floraison et début de fructification.



Espèce voisine : *Crotalaria podocarpa*.



Jeunes fruits en début de fructification.



Espèce voisine : *Crotalaria podocarpa*.

