

Plantago amplexicaulis Cav.



Han

Synonyme : *Plantago lagopoides* Desf. (1798)

Description : herbe formant de petites touffes lâches d'où émergent de longues hampes florales de 15-20 centimètres de haut. **Feuilles** plus ou moins velues, linéaires, lancéolées, s'atténuant en un pétiole entourant la tige. **Épis** (sub-globuleux) pubescents d'environ 2-2,5 centimètres de long, portés par de longs pédoncules s'affaissant en vieillissant. **Bractées** plus larges que longues ; corolle petite et glabre.

Biogéographie : espèce méditerranéo-saharo-sindienne.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte.

Port : herbe annuelle.

Préférences édaphiques : espèce eury-psammophile.

Préférences hydriques : espèce (xéro-)mésophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : espèce présente sur les sables plus ou moins limoneux (alluviaux), à proximité des zones de cultures.

Intérêt pour le Crique pèlerin : offre peu de possibilité d'abri mais peut être consommée. Présente dans les biotopes de survie ou de reproduction.

Références bibliographiques

Ozenda	409	Quézel & Santa	861	Barry & Celles	295	Nègre	II-224
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--------



Aspect général.



Feuille lancéolée, à nervures parallèles. La base du pétiole embrasse amplement la tige. La pilosité est diffuse.



Inflorescences en épis globuleux.

