



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive,  
Enumeratio contracta ordinum generum specierumque  
plantarum huc usque cognitarium, juxta methodi naturalis,  
normas digesta**

Parisii :Sumptibus Sociorum Treuttel et Wurtz,1824-73.

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/286>

**v.14 (1857):** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/109211>

Page(s): Page 556

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 17 July 2019 11:43 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/096347200109211.pdf>

This page intentionally left blank.

NY 16. *T. TARTONRAIRA* (All. fl. pedem. 4, p. 133, n. 486), tota argenteo- vel flavido-sericea, foliis coriaceis obovatis vel obovato-oblongis nervosis, floribus axillaribus aggregatis polygamis, bracteolis ovatis obtusis imbricatis, calyce folio brevior, lobis obtusis tubo subæquantibus. ♂ In littorali Mediterraneo: Hispaniâ (Boiss.), Galliâ australi, Niceæ, in Corsicâ, Sardiniâ, Barbariâ? regno Neapolitano, Siciliâ (Tenore! Heldreich!), Græciâ, Peloponeso (Spruner! Boiss.! Kotschy!), Cretâ (Sieber!), Cypro (Broussonet!), Bosphoro (Beaupré), Chio, Rhodo, Asiâ minore (Aucher-Eloy, n. 1009! 2519), — Bertol. fl. ital. 4, p. 343. Reichenb. ci. fl. germ. 11, p. 13, t. 552. *Sanamunda argentea latifolia* Barrel. ic. t. 224. *Daphne Tartonraira* Linn. sp. ed. 4, p. 356, Vahl symb. 3, p. 53, Lam. dict. 3, p. 436, ill. t. 290, f. 2, DC. fl. fr. 3, p. 357. *D. candicans* Lam. fl. fr. 3, p. 224. *Passerina Tartonraira* Schrad. neu. Journ. 4, 1, p. 89, DC. l. c. 6, p. 366, Wikstr. Thym. l. c. p. 327, Sibth. et Sm. fl. græc. t. 354. *Chlamydanthus Tartonraira* C. A. Mey. l. c., Griseb. spicil. fl. rumel. 2, p. 322. Fruticulus palmari-pedalis, iterato ramosus, totus sericeo-canescens, albidus vel fulvescens, ramis divaricatis rigidis. Folia coriacea, imbricata, mox patula, 5-10 lin. longa, extra medium  $2\frac{1}{2}$ -4 lin. lata. Flores copiosi, 2-5 in superioribus axillis glomerati, bracteolis ovatis obtusis tomentosis imbricatis stipati, albidi. Calyx  $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longus, lobis patulis tubo obconico subæquilongis. Antheræ superiores exsertæ. (v. s.)

β. *angustifolia* (d'Urville enum. pl. Archipel. p. 42, n. 350), foliis spathulato-linearibus canis vel subsericeis, bracteolis sæpe acutiusculis. — Crescit promiscue cum typo speciei, sed prævalens in regionibus magis orientalibus, Græciâ, Syriâ, etc., Tschesme (Olivier!), Smyrnâ (Balansa, n. 373!), nec non in excelsioribus Sierræ Nevadæ et Tejedæ (Boiss.). — Boiss. voy. Esp. 2, p. 555. *Sanamunda argentea angustifolia* Barrel. ic. t. 222. *Daphne argentea* Sibth. et Smith fl. græc. 4, p. 258, t. 355, Sieber! herb. Cret. *D. argentata* et? tomentosa Lam. dict. 3, p. 436. *D. osyroides* Vahl herb., ex Wikstr. Thym. p. 328. *Passerina tomentosa* Wikstr. l. c. p. 332? *Chlamydanthus argenteus* C. A. Mey. l. c. *Thymelæa argentea* Endl. gen. suppl. 4, 2, p. 65, C. Koch in Linnæa 22, p. 610. Folia extra medium vix ultra 1 lin. lata, plerumque minus sericea. Florum glomeruli copiosiores. Cæt. omn. ut in typo speciei. (v. s.)

γ. *calvescens* (Gren. et Godr. fl. fr. 3, p. 63), foliis oblongo- vel spathulato-linearibus glabris nervosis. — In Corsicâ, inter Ponte d'Asco et Ponte alla Leccia (Phil. Thomas!). *Passerina Thomasii* Duby! Bot. Gall. 4, p. 406. *Thymelæa Thomasii* Endl. l. c. p. 66. *T. Tartonraira* β *Thomasii* Reichenb. ic. fl. germ. 11, p. 13, t. 552, n. 1172. Forma insignis foliis haud argenteis, vix ac ne vix tomenti reliquias inter nervos retinentibus, glaucescentibus, cæteroquin a formâ vulgari haud diversa. (v. s.)

NY 17. *T. MICROPHYLLA*, caule adscendente virgato fastigiato ramosissimo, ramis rigidis mox aphyllis albido-tomentosis, foliis coriaceis ovalibus lanceolatisque planis sericeis, floribus in apice ramulorum brevissimorum 3-5 sessilibus polygamo-monoicis folia superantibus, calyce ♂ cylindræo sericeo, ♀ ovato brevivilloso, lobis ovatis obtusis conniventibus. ♂ In Algeriæ distr. Saïda et circa Biskra (Cosson! Balansa, n. 256! 826!), in deserto Tunetano (Kralik, n. 333!). *Passerina microphylla* Coss. et Durieu! in Balansa pl. exsicc. Alger. n. 826. Frutex 1-2-pedalis, rigidus, caule valido, ramis patulis strictis vel adscendentibus simplicibus vel iterum fastigiato-ramulosis. Folia sparsa, 1-2 $\frac{1}{2}$  lin. longa, 1-1 $\frac{1}{2}$  lin. lata, 1-nervia, evenia, acuta vel obtusa, ramulorum steriliū remotiuscula adpressa, floralia dense imbricata ovali-subrotunda, demum patula. Fasciculi 3-5-flori pseudo-axillares, scil. ramulos brevissimos foliosos terminantes. Calyx flavus, masc. 2 $\frac{1}{2}$  lin. longus, cylindricus, basi angustatus, tubo pube brevi patulâ villoso, lobis sericeis tubo duplo (in fem. dimidio) brevioribus. Ovarium obovato-oblongum, basi attenuatum, glabrum, apice parce pilosiusculum, in fl. masc. obsoletum. Stylus dimidium ovarium æquans. Nucula sessilis, ovata, viridis, lævis, suturis 2 conspicuis. Affinis *T. canescens*, sed habitu vegetiore (potius *T. hirsutæ* et *Tartonrairæ*), ramulis firmis rigidis, pubescentiâ in ramis minute tomentosa; in foliis adpresse sericeâ (nec patulâ), etc., satis distincta. (v. s. in herb. DC.)

NY 18. *T. CANESCENS* (Endl. gen. suppl. 4, 2, p. 65), ramulis debilibus tomentosis, foliis herbaceis lanceolatis vel ovato-oblongis acutis dense sericeo-villosiusculis, capitulis terminalibus paucifloris passimque axillaribus subunifloris, calyce folia subæquante sericeo-cano, lobis ovatis obtusis tubo tenui cylindrico duplo brevioribus.

The following text is generated from uncorrected OCR.

[Begin Page: Page 556]

irt

lytf

556 DICOTYL. seu EXOGEINLE. thymeljea.

16. T. Tartonraira (AU. fl. pedem. l. p. 133, n. 486), tota argenteo- vel flavido-sericea, foliis coriaceis obovatis vel obovato-oblongis nervosis, floribus axillaribus aggregatis polygamis, bracteolis ovatis ..obtusis imbricatis, calyce folio brevior, lobis obtusis tubo subaequantibus. 5 In littorali Mediterraneo : Hispania (Boiss.!), Gallia australi, Nicea<sup>3</sup>, in Corsica, Sardinia, Barbaria? regno Neapolitano, Sicilia (Tenore! Heldreich!), Grsecia, Peloponeso. ( Sprenger ! Boiss. ! Kotschyl), Creta (Sieber!), Gypro- (Brousse<sup>3</sup> !), Bosphoro (Beaupre), Chio, Rhodo, Asia minore (Aucher-Eloy, n. 10091 & 519), — Bertol. fl. ital. 4, p. 343. Reichenb. ci. fl. germ. 11, p. 13, t. 552. Sanamunda argentea latifolia Barrel ic t. "221. Daphne Tartonraira Linn. sp. ed. 1, p. 356, Vahl symb. "3, p. 53, Lam. diet. 3, p. 436', ill. t. 290, f. 2, DC. fl. fr. 3, p. 357'. D. candidans Lam. fl. fr. 3, p. 221. Passerina Tartonraira Schrad. neu. Journ. 4, 1, p. 89, DC. 1. c. 6, p. 366, Wikstr. Thym. 1. c. p. 327 ", Sibth. et Sm. fl. grsec. t. 354. Chlamydanthus Tartonraira C. A. Mey. 1. c, Griseb. spicil. 11. rumel. 2, p. 322. Fruticulus palmari-pedalis, iterj-ato ramosus, totus sericeo-canescens, albidus vel fulvescens, ramis divaricatis rigidis. Folia coriacea, imbricata, mox patula, 5-10 lin. longa, extra medium 2A-4 lin. lata: Flores copiosi, 2-5 in superioribus axillis glomerati, bracteolis ovatis obtusis tomentosis imbricatis stipati, albid. Calyx l. 2 lin. longus, lobis patulis tubo obconico subaequilongis. Antheras superiores exsertae. (vi s.) N

(5. *arigustifolia* (d'Urville enum. pl. Archipel. p. 42, n. 350), foliis spathulato-linearibus canis vel subsericeis, bracteolis saepe acutiusculis. — Grescit promiscue cum typo speciei, sed praevalens in regionibus magis orientalibus, Græcia, Syria, etc, Tschesme (Olivier!), Smyraa. (Balansa, n. 3731), nec non in excelsioribus Sierrae Nevadae Tejedae (Boiss.). — Boiss. voy. Esp. 2, p. 555. *Sanamunda argentea angustifolia* Barrel. ic t. 222. *Daphne argentea* Sibth. et Sroith fl. graec 1, p. 258, t. 355, Sieberl herb. Cret. D. *argentata* et? *tomentosa* Lam. dict. 3, p. 436. D. *osyroides* Vahl herb., ex Wikstr. Thym. p. 328. *Passerina tomentosa* Wikstr. 1. c. p. 332 ? *Chlamydanthus argenteus* C. A. Mey. 1. c. *Thymelaea argentea* Endl. gen. suppl. 4, 2, p. 65, C. Koch in Linnaea 22, p. 610. Folia extra medium vix ultra 1 lin. lata, plerumque minus sericea. Florum glomeruli copiosiores. Caet. omn. itt in typo speciei. (v. s.)

*y. calvescens* (Gren. et Godr. fl.-fr. 3, p. 63), foliis oblongo-vel spathulato-linearibus glabris nervosis.— In Corsica, inter Ponte d'Asco et Pontealla Leceia (Phil. Thomas !).- *Passerina Thomasii* Duby! Bot. Gall. 1, p. 406. *Thymelaea Thomasii* Endl. 1. c p. 66. T. *Tartoneira* (3 *Thomasii* Reichenb. ic. fl. germ. H, p. 13, t. 552, n. 1172. Forma insignis foliis haud argenteis, vix ac ne vix tomenti reliquias inter nervos retinentibus, glaucescentibus, caeteroquin a forma vulgari haud diversa. (v. s.)

17. T. *microphylla*, caule adscendente virgato fastigiato ramosissimo, ramis - rigidis mox aphyllis albido-tomentosis, foliis coriaceis ovalibus lanceolatisque

planis sericeis, floribus in apice ramulorum brevissimorum 3-5 sessilibus polygamo-monoicis folia superantibus, calyce a\* cylindraco sericeo, Q ovato brevivilloso, lobis ovatis obtusis connatis. In Algeria distr. Saïda et circa Biskra (Cosson! Balansa, n. 256! 8261), in deserto Tunetano (Kralik, n. 3331). *Passerina*

microphylla Coss. elDurieu! in Balansa pl. exsicc. Alger. n. 826. Frutex 1-2-pedalis, rigidus, caule valido, ramis patulis strictis vel aascentibus simplicibus vel iterum fastigiato-ramulosis. Folia sparsa, 1-2-jlin. longa, 1-1{ lin. lata, 1-nervia, evenia, acuta vel obtusa, ramulorum steriliu remotiuscula adpressa, floralia dense imbricata ovali-subrotunda, demum patula. Fasciculi 3-5-flori pseudo-axillares, scil. ramulos brevissimos foliosos terminantes. Calyx flavus.masc. 2A lin. longus, cylindricus, basi angustatus, tubo pube brevi patula villosus, lobis sericeis tubo duplo (in fem. dimidio) brevioribus. Ovarium obovato-oblongum, basi attenuatum, glabrum, apice parce pilosiusculum, in fl. masc obsoletum. Stylus-dimidium ovarium aequans. Nucula sessilis, ovata, viridis, tevis, suturis 2 conspicuis. A(Hnis T. canescenti, sed habitu vegetiore (potius T. hirsutae et Tartonraira?), ramulis firmis rigidis, pubescentia in ramis minute tomentosa; in foliis adpresse sericea(nec patula), etc, satis distincta. (v. s. in herb. DC.)

18. T. canescens (Endl. gen. suppl. 4, 2, p. 65), ramulis debilibus tomentosis, foliis V herbaceis lanceolatis vel ovato-oblongis acutis dense sericeo-villosiusculis, capi-

tulis terminalibus paucifloris passimque axillaribus subunifloris, calyce folia subaequante sericeo-eano, lobis ovatis obtusis tubo tenui cylindrico duplo brevioribus.