


1765. **A. Saharæ** Pomel. Nouv. Mat., p. 177 (1874) : Batt. Suppl. Fl. Alg. p. 36 — *Genista Pomeliana* Maire, in J. et M. Cat. Maroc, p. 356, 1028 ; M.C. 1533 — h. Sous-arbrisseau densément vilieux velouté, multicaule, à souche ligneuse, courte, verticale, prolongée en racine pivotante, ordinairement très rameuse. Tiges étalées ou ascendantes, ligneuses à la base, rameuses, cylindriques, 5-15 cm long., densément vilieuses-veloutées par des poils  $\pm$  raides, dressés ou étalés-dressés, parfois étalés et même un peu rétrorses, non apprimés, 0,35-0,5 mm long., bien feuillées. Feuilles pétiolées, trifoliolées ; pétiole semicylindrique, plat ou légèrement canaliculé sur la face interne, à indument semblable à celui de la tige, pouvant atteindre 8 mm long. ; folioles conformes, subsessiles, ovales ou obovales, un peu atténuées à la base, arrondies ou ogivales et mucronées au sommet, entières, 5-7  $\times$  2-2,5 mm, atteignant rarement 10  $\times$  5 mm, densément vilieuses-soyeuses sur les deux faces, à poils subapprimés, souvent pliées longitudinalement. Nervation pennée ; nervure médiane forte et un peu saillante en dessous ; nervures secondaires très grêles, rameuses et anastomosées en réseau assez lâche, difficilement visibles même par transparence. Stipules légèrement concrescentes à la base avec le pétiole élargi, herbacées, lancéolées, vilieuses, 1-2 mm long., ordinairement dressées, peu divergentes. Fleurs en grappes ombelliformes 2-5-flores oppositifoliées ou terminales, formant des fascicules subsessiles ou très brièvement pédonculés, rarement à pédoncule allongé, pouvant atteindre 15 mm. Pédoncules floraux très courts, 1-1,5 mm, très vilieux, étalés-dressés, étalés ou  $\pm$  arqués-récurvés, pourvus à la base d'une bractée linéaire-lancéolée, herbacée, vilieuse, ordinairement aussi longue qu'eux, et au-dessus du milieu de 2 bractéoles linéaires, du reste semblables à la bractée, atteignant ordinairement le sommet du tube calicinal. Fleurs 9-11 mm long., jaunes parfois à la fin  $\pm$  teintées de pourpre violacé sur l'étendard et les ailes. Calice 6,5-7,5 mm long., vilieux-soyeux extérieurement, vert grisâtre, fendu jusqu'aux 3/4 en deux lèvres égales ; tube calicinal 15-nervié, c. 2 mm long., à partie réceptaculaire brièvement campanulée : labre divisé jusqu'au milieu en deux lobes triangulaires-lancéolés, dressés, droits, très aigus : labiole divisé jusqu'un peu au delà du 1/3 en trois dents très aiguës : dents latérales lancéolées, un peu arquées-divergentes, la médiane plus étroite, linéaire-lancéolée, aussi longue ou légèrement plus longue que les latérales. Corolle glabre dépassant  $\pm$  le calice : étendard sub-orbiculaire, 7-10  $\times$  5-8 mm, arrondi et  $\pm$  émarginé au sommet,  $\pm$  plié en long, multinervié, atténué en onglet court ; ailes un peu plus courtes que l'étendard, oblongues, dressées, contractées à la base en onglet court, pourvues d'une oreillette très courte et large, non défléchie. Carène un peu plus courte

FIG. 44 — *Argyrolobium Saharæ*.

que les ailes, semi-oblongue, fortement courbée, à bord supérieur presque droit, obtuse-subrostrée, contractée en 2 ongllets courts et étroits, pourvue de 2 oreillettes à peine marquées. Adelphe staminale glabre, fendue sur la face postérieure jusqu'à la base ; anthères jaunes, alternativement oblongues, basifixes, c. 1 mm, et ovoïdes, médifixes, c. 0,5 mm. Ovaire sessile, linéaire, très villos, 3-6-ovulé, atténué ou un peu contracté en un style plus court que lui : style glabre, calleux, fortement arqué, comprimé et dilaté à la base (en griffe de chat), jaune, terminé par un stigmate capité-déprimé légèrement oblique en dehors. Gousse non stipitée, entourée à la base par le calice marcescent, linéaire, comprimée, toruleuse, 1,5-2×3,5 mm, jaune brun, longuement villos, à villosité étalée, molle, atteignant 1,25 mm long., rostrée par le style persistant, 3-6-sperme. Graines lenticulaires, très comprimées, suborbiculaires, 2,75-3 mm diam., lisses, un peu luisantes, brunes avec quelques petites taches noires, échancrées au niveau du hile ponctiforme, à radicule saillante : funicule très court. Floraison : février-avril.

Rochers et rocailles des régions arides et désertiques, jusque vers 1 500 m — A. Laghouat ! (CHEVALLIER) — M. Anti-Atlas ; versant Sud du Grand Atlas — Sahara septentrional : Ziban ! (BATT.) ; Maïa ! (POMEL) ; Sahara marocain près de Bou-Denib ! et de Mrimina ! (HUMBERT, PELTIER)

**Aire géographique** — Endémique.