


1763. **A. uniflorum** (Dec.) Jaub. et Spach. Ann. Sc. Nat. Ser. 2, 19, p. 45 (1843) ; B. et T. Fl. Alg. p. 207, et Fl. Syn. p. 86 ; Pamp. Pl. Trip. p. 129, et Fl. Ciren. p. 244 ; B. et B. Cat. Tun. p. 98 ; M. C. 1799 ; non Harv. et Sonder, Fl. Cap., 2, p. 72 (1861) — *Cytisus uniflorus* Decaisne, Ann. Sc. Nat., ser. 2, 3, p. 365 (1834) — *Genista uniflora* (Dec.) Briquet, Cytises Alp. Mar. p. 120 (1894) ; J. et M. Cat. Maroc, p. 356, 1028 ; Maire, Sahara central, p. 122 — h. Sous arbrisseau vilieux-soyeux, multicaule, à souche courte, verticale, prolongée en racine pivotante. Tiges étalées ou ascendantes, assez grêles, effilées et rigides, très rameuses, 10-60 cm long., cylindriques,  $\pm$  densément vêtues de poils simples, très apprimés, atteignant 0,8 mm, lâchement feuillées. Feuilles pétiolées, trifoliolées ; pétiole 1-6 mm long., subcylindrique, à peine déprimé en dessus, vilieux-soyeux ; folioles oblongues, obovales-oblongues ou linéaires-lancéolées, sessiles, atténuées à la base, aiguës et  $\pm$  mucronées au sommet, entières, vilieuses-soyeuses sur les deux faces, planes ou un peu pliées longitudinalement 3-15  $\times$  1,5-2,5 mm. Nervation pennée ; nervure médiane sail-lante en dessous ; nervures secondaires grêles, rameuses et anastomosées en réseau assez dense, visible seulement par transparence. Stipules herbacées, linéaires-lancéolées, aiguës, vilieuses-soyeuses,  $\pm$  divergentes, plus courtes que le pétiole. Fleurs opposées aux feuilles, ordinairement solitaires, rarement en grappe 2-flore, à pédoncules courts. Pédoncule sans bractée, mais portant vers son milieu 2 bractéoles herbacées, linéaires, courtes (c. 1 mm), souvent récurvé, vilieux-soyeux. Fleurs petites (c. 7,5 mm long.), jaune sulfurin. Calice c. 6 mm long., vilieux-soyeux extérieurement, profondément bilabié ; tube calicinal court, campanulé, 11-nervié, à partie réceptaculaire égalant au plus la moitié du tube ; labre et labiole subégaux ; labre divisé jusqu'au-delà du 1/3 en deux dents dressées, triangulaires-lancéolées, aiguës ; labiole divisé jusqu'au 1/3 en 3 dents ; dents latérales lancéolées, dent médiane subulée, un peu plus courte, toutes aiguës. Corolle glabre dépassant brièvement le calice ; étendard obovale, c. 6 mm long., arrondi au sommet, atténué en onglet étroit c. 2 mm long. ; ailes c. 5,5 mm long., oblongues, obtuses, contractées en onglet c. 1,8 mm long., avec une oreillette courte et large, non défléchie ; carène semiobovale, très obtuse, un peu coudée sur le dos, c. 6 mm long., à onglets et oreillettes semblables à ceux des ailes. Adelphie staminale glabre ; anthères, alternativement oblongues-linéaires, basifixes, c. 0,75 mm, et ovoïdes, dorsifixes, c. 0,2 mm. Ovaire densément vilieux, oblong-linéaire, 10-12-ovulé,

FIG. 42 — *Argyrolobium uniflorum*.

sessile, atténué en style glabre au sommet, plus court que lui, persistant, peu arqué, terminé par un stigmate tronqué, non dilaté. Gousses souvent réfléchies, ou étalées, très brièvement pédonculées, à pédoncule  $\pm$  épaissi, entourées à la base par le calice persistant, non stipitées, linéaires, comprimées, toruleuses,  $\pm$  coriaces, déhiscentes, 6-10-spermes, densément villeuses-soyeuses, rostrées par la base du style droite ou presque droite. Graines ovoïdes-subglobuleuses, c.  $1,75 \times 1,6$  mm, lisses, luisantes, olivâtres ; hile orbiculaire très petit, ponctiforme ; funicule filiforme. Floraison : février-avril et après les pluies dans le Sahara.

Rocailles et pâturages sablonneux des régions arides et désertiques, ou parfois des régions semiarides — Cyr. Dunes d'Adjedabia (CAVARA) Tr. Assez commun dans la Syrtique, sur le littoral entre Tripoli et Misourata. et sur les

collines de Homs à Garian — T. Commun dans le Sud ; îles Djerba et Kerkenna ; remonte au Nord jusqu'à Sousse, et même entre Hammamet et Groumbalia — Alg. Hauts-Plateaux à Bou-Saâda ! Chahbouniya !, etc ; Atlas saharien depuis la région d'Aflou jusqu'au Maroc ; Aurès méridional — M. Atlas Saharien ; versant Sud du Grand Atlas oriental ; Sargho ; Anti-Atlas-Sahara septentrional : commun de la Tripolitaine au Maroc — Sahara central : commun dans l'étage méditerranéen inférieur du Hoggar.

**Aire géographique** — Egypte. Arabie Pétrée, Palestine et Syrie.

**Observations** — *A. uniflorum* f. *compactum* Cavara, Bull. Ort. Bot. Napoli, 9, 1, p. 45 (1928), nous paraît n'être qu'un état brouté de la plante.