

Astragalus eremophilus Boiss.



Han

Synonymes : *Astragalus chudaei* Batt. & Trab. (1907)
Astragalus geniorum Maire (1929)
Astragalus schimperi auct.

Description : plante herbeuse, constituée d'une rosette de grandes feuilles et de tiges rampantes (3 à 20, voire 50 centimètres de long) et velues, ce qui lui confère une couleur plus ou moins cendrée. Longues **tiges** florifères prostrées. **Feuilles** imparipennées, petites folioles (moins de 8 paires). **Fleurs** petites, blanchâtres plus ou moins teintées de bleu violet, stigmates barbus, munis de long poils (il faut une loupe). Inflorescence longuement pédicellée. **Fruit** : gousse cylindrique plus ou moins arquée, velue (longs poils blanchâtres).

Biogéographie : espèce saharo-sindienne.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte.

Port : herbe annuelle rampante.

Préférences édaphiques : espèce psammophile.

Préférences hydriques : espèce hyper-xérophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : espèce des pelouses de la zone saharo-méditerranéenne sur regs plus ou moins ensablés.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : plante consommée mais ne pouvant pas fournir qu'un médiocre abri.

Espèces voisines : *Astragalus mareoticus* Delile est physionomiquement assez proche mais assez facile à distinguer : fleur bleue, stigmate non barbu, plante non velue, gousse dotée de poils courts apprimés et nettement plus arqués, folioles plus nombreuses (plus de 8 paires). L'espèce est aussi plus méditerranéenne.

Astragalus hauarensis Boiss. (= *A. gyzensis* Bunge) a un port similaire mais des folioles de plus de 8 millimètres de large.

Références bibliographiques

Ozenda	302	Quézel & Santa	550	Barry & Celles	232	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--



Port en rosette avec de longues tiges prostrées.



Fleur de petite taille (moins de 6 mm), blanc jaunâtre, lavée de violet.



Gousses velues, légèrement arquées.

