

GENISTA CAPITELLATA COSS. ap. Kralik in Bourgeau *pl. Alger. exsicc.* n. 223 (1856).

Fruticulus habitu Erinaceæ, 3-6 decim. altus, erectus vel subdiffusus, ramosissimus, dumosus, ramis striatis suberectis, ramis vetulis strictis vel tortuosis cortice fuscescente vel castaneo, ramulis novellis cortice virescente sericeo-pubescentibus demum glabrescentibus, confertis alternis vel fasciculatis, strictis, rigidis, apice subspinescentibus vel florigeris, foliorum pulvinis demum modice incrassatis; foliis sessilibus, 1-foliolatis, alternis vel basi ramulorum novellorum oppositis, foliolis 3-5 millim. longis, sericeo-pubescentibus, obovato-oblongis oblongisve, arefactione sæpius plus minus involutis, per anthesim sæpius nondum deciduis; stipulis minutis dentiformibus spinescentibus; floribus parvis, apice ramulorum 3-6 capitatis subsessilibus, bibracteolatis, bracteolis calyce contiguis tubum calycis subæquantibus linearibus; capitulis bracteis lanceolatis vel lanceolato-linearibus calyces subæquantibus vel brevioribus stipatis; calyce persistente, cum bracteis bracteolisque sericeo-pubescente, obconico-campanulato, bilabiato, labio superiore inferius subæquante bipartito lobis ovato-vel lanceolato-triangularibus acutis, labio inferiore fere ad basim in dentes 3 lineares fisso; corolla marcescente, flava, vexillo amplo ovato superne parce pubescenti-sericeo carinam subæquante, alis carinæ subæquilongis isti subæquilatis cultriformi-oblongis obtusis glabris, carina cultriformi-oblonga obtusa sericeo-pubescente; ovario oblique ovato acuminato, calyce brevioris, sericeo-villoso, ovulis subquinque 3-4 abortivis; stigmate minuto, introrsus obliquo; legumine.... — Florens 7^a die junii 1856 lecta.

In provinciæ Oranensis regione montana inferiore australiore, in rupes-

tribus ad locum dictum *Guelta Abdesson!* inter *Kadra* et *Aïn-Madhy*; in provincia Algeriensi australiore, inter *Djelfa* et *Messad* ad oppidulum *Ksar Moudjebar*, et in ditioe *Ouled Dhia* montis *Djebel Sahari* (Reboud).

Le *G. capitellata*, voisin du *G. microcephala* Coss. et DR. (ap. Balansa *pl. Alger. exsicc.* n. 1018 et in *Bull. Soc. Bot.*), qui croit dans des stations analogues de la province de Constantine, doit, avec cette espèce, être placé à côté des *G. umbellata* Poir. et *equisetiformis* Spach (in *Ann. sc. nat.* sér. 3, III, 142) et par conséquent être rapproché du sous-genre *Stenocarpus* (Spach loc. cit., 106). Il diffère du *G. microcephala* par les capitules de fleurs plus petits à bractées lancéolées ou lancéolées-linéaires, et non pas ovales ou oblongues-lancéolées acuminées, par les bractéoles linéaires, et non pas oblongues-lancéolées, par les calices munis ainsi que les bractées et les bractéoles d'une pubescence soyeuse, et non pas très-velus, et surtout par les dents du calice; dans le *G. capitellata* les dents de la lèvre supérieure sont triangulaires ou ovales lancéolées-aiguës, et celles de la lèvre inférieure linéaires, tandis que dans le *G. microcephala*, celles de la lèvre supérieure sont acuminées-subulées et celles de la lèvre inférieure linéaires-subulées.