

Astragalus vogelii* (Webb.) Bornm. subsp. *vogelii



Basionyme : *Phaca vogelii* Webb (1848)

Synonymes : *Astragalus gautieri* Batt. & Trab. (1907)

Astragalus prolixus Sieber ex Bunge

Astragalus vogelii (Webb) Bornm. (1915)

Astragalus vogelii subsp. *prolixus* (Sieber ex Bunge) Maire (1933)

Description : herbe couverte de poils courts, blanchâtres, pouvant former de petites touffes avant que les tiges ne s'allongent et deviennent rampantes (de 10 à 50 centimètres). **Tige** érigée puis rampante. **Fleurs** petites, de couleur bleue légèrement violacée, en grappes plus ou moins contractées ou allongées. **Fruits** : gousses petites (moins de 8 millimètres), dilatées en forme de gros grain de blé.

Biogéographie : espèce saharo-sindienne.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte.

Port : herbe annuelle.

Préférences édaphiques : espèce eury-psammophile.

Préférences hydriques : espèce xérophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : espèce des pelouses psammophiles sur sols plus ou moins compactés.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : elle peut être consommée mais n'offre qu'un abri médiocre.

Références bibliographiques

Ozenda	304	Quézel & Santa	548	Barry & Celles	232	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--



Individu âgé et mutilé (brouté).



Touffe moyenne rampante.



Grande touffe, tige de plus de 50 cm de long.



Détail des feuilles, fleurs et fruits.

