Neurada procumbens L.



Han

Le genre *Neurada* était anciennement rangé parmi les Rosaceae.

Description : herbe rampante. **Tige** densément tomenteuse, grise, ne dépassant pas 15 centimètres de haut et parfois enfouie sous les apports de sables éoliens. **Feuilles** presque charnues, ovales, dentées et velues. **Fleurs** assez petites (environ 5-7 millimètres de diamètre). Pétales blancs, 5 carpelles contenant chacun une graine. À maturité, le **fruit** est inclus dans un disque épineux (calice induré) qui permet une dissémination par les animaux (zoochorie). Les **graines** germent à l'intérieur du fruit qui persiste souvent au niveau du collet des jeunes plants.

Biogéographie : espèce saharo-sindienne.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte.

Port : plante annuelle.

Préférences édaphiques : espèce sténo-psammophile.

Préférences hydriques : espèce hyper-xérophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : plante caractéristique des zones ensablées, où elle est parfois très abondante.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : peut difficilement servir d'abri mais est susceptible d'être consommée.

Références bibliographiques

Ozenda	278	Quézel & Santa	451	Barry & Celles	282	Nègre	



Bel échantillon de plus de 50 cm de diamètre, en fin de floraison et début de fructification.



Jeunes fruits.



Feuilles et fleur, dont on aperçoit le calice.



Jeune fruit, de profil.



Vieux fruit.



Exemple de zoochorie (dissémination des graines par les animaux, l'homme en l'occurrence).

