Section **CATACLASTOS** Doell

Rachéole se fragmentant en articles. Lemmes membraneuses, glabres. Epillets petits, se désarticulant à maturité en faux fruits constitués par le caryopse enveloppé par la lemme et la paléole.

246. **E. diplachnoides** Steud., Gram., p. 268 (1855) ; Hutch. et Dalz., Fl. W. Trop. Afr. 2, p. 515. — *E. interrupta* Trabut, Bull. Soc. Bot. France, 58, p. 629 ; Maire, Sahara central, p. 68, 411 ; non (Lamk.) P. B. — ①. Herbe verte. Chaumes fasciculés, dressés ou genouillés ascendants, 10-40 cm, glabres et lisses, à peine striés. Gaines arrondies sur le dos, un peu carénées au sommet, striées, glabres, lisses, apprimées ; ligule membraneuse, courte, tronquée, à peine érodée-fimbriée ; limbe pouvant atteindre 15 cm × 4 mm, plan puis ± involuté par la sécheresse, glabre, strié et scabre extérieurement, sillonné et à peine scabre intérieurement, à marges scabres, à sommet longuement atténué en pointe fine. Panicule dressée, ± longuement exserte, lancéolée dans son contour, pouvant atteindre 40 × 8 cm, ± lâche ; axe glabre, ± scabre ; rameaux étalés-dressés, solitaires ou fasciculés par 2-3, longuement nus à la base, scabres, très rameux ; pédoncules peu ou pas épaissis au sommet, souvent > épillet. Epillets pauciflores (à 3-6 fleurs), c. 2 × 1 mm, oblongs. Glumes oblongues, obtuses, subégales, c. 0,7-0,8 mm, 1-nerviées, scabres sus la carène. Lemmes oblongues, arrondies ou tronquées au



Fig. 306.
Eragrostis diplachnoides.

sommet, c. 1 mm, tricarénées, à carène médiane un peu scabre. Paléole subégale, très obtuse, bicarénée, à carènes très scabres. Lodicules 2, minuscules, arrondies, c. 0,1 mm. Anthères 2, jaunes ou violacées, c. 0,35 mm. Caryopse jaune brun, luisant, oblong, c. 0,4 × 0,2 mm, non aplati ; embryon c. 0,18 mm. Floraison : après les pluies.

Lits des torrents, nappes d'épandage du Sahara. — Sahara central : In Ezzan au S de Djanet ! (SÉROLE).

Aire géographique. — Afrique tropicale et équatoriale. Arabie. Inde.