198. **O. caerulescens** (Desf.) Richt., Pl. Eur. 1, p. 34 (1890) ; B. et T., Fl. Syn. p. 366, et Fl. Alg. Mon. p. 167 ; Pamp., Pl. Trip. p. 30, et Fl. Ciren. p. 102 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 35, 860, 927 ; M., C. 747 ; Maire, Sahara central, p. 63. — *Milium caerulescens* Desf., Fl. Atl. 1, p. 66, t. 12. — *Piptatherum caerulescens* (Desf.) P. B., Agrost. p. 18 (1812) ; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 73 ; B. et B., Cat. Tun. p. 460. — ♃. Cespiteux, en petites touffes ; chaumes dressés, 30-70 cm, glabres, striés, lisses. Gaines inférieures des chaumes et des innovations persistant longtemps après leur mort, et presque toujours vêtues de noir par le mycélium du Champignon *Neopeckia Oryzopsis* Maire ; gaines vivantes arrondies sur le dos, glabres, striées, ordinairement ± scabres, ± glauques comme les limbes et les chaumes ; ligule allongée (6-9 mm), ordinairement obtuse et denticulée au sommet, très brièvement pubescente sur le dos ; limbe plan puis enroulé, atteignant 40 cm × 2,5 mm, atténué en pointe non piquante, strié et scabre sur les 2 faces et les marges. Panicule atteignant 20 cm, lâche, dressée, relativement pauciflore, à axe lisse et glabre, à rameaux dressés ou étalés-dressés, solitaires ou géminés, lisses ou un peu scabres, longuement nus, atteignant au maximum 10 cm, ramules scabres, pédoncules latéraux très courts, les terminaux pouvant dépasser un peu la longueur de l'épillet, tous dilatés claviformes sous l'épillet. Epillets 6-8 mm long., presque toujours panachés de vert et de bleu. Glumes ovales-lancéolées, acuminées, égales ou l'inférieure un peu plus longue, 3-5-nerviées, glabres, un peu scabres sur la carène. Lemme 5-nerviée, indurée, lancéolée, c. 3,5-4 mm, obtusément carénée sur le dos, involutée, obtuse, très glabre, lisse et luisante, brune puis noirâtre, portant à sa base un anneau de poils courts au dessus d'un callus très court, glabre et obtus, et à son sommet une arête droite très scabre, courte (3 mm), ne dépassant pas les glumes. Paléole subégale, indurée, involutée, glabre, 2-nerviée. Lodicules 2, linéaires-lancéolées, 0,6-0-7 mm. Anthères 3, jaunes, portant des pinceaux de quelques



FIG. 257.
Oryzopsis caerulescens.

poils très courts au sommet, c. 3 mm. Caryopse jaune-brun, ellipsoïdal peu comprimé, subaigu aux 2 bouts, lisse, c. 2,5 × 1,25 mm, à macule hilaire linéaire formant sillon et atteignant le sommet ; embryon court, voilé par les lodicules persistantes, c. 0,8 mm. Floraison : mars-juin.

Clairières pierreuses des forêts, rocailles, rochers, pâturages pierreux, depuis le littoral jusque vers 2.700 m. — Cyr. Assez fréquent dans les ravins de la Montagne Verte ! — Tr. Leptis Magna (DELLA CELLA). — T. Fréquent dans la Tunisie moyenne et la Tunisie septentrionale orientale. — C. Rare sur le littoral : Bougie (M.) ; fréquent dans les Hauts Plateaux et les Aurès. — A. Assez rare sur le littoral : Castiglione ! (CLAUSON) ; fréquent dans l'intérieur jusqu'à l'Atlas saharien. — O. Commun depuis le littoral jusqi'à l'Atlas saharien. — M. Commun dans tout le Maroc jusqu'au Sahara. — Sahara central : Hoggar de 2.000 à 2.700 m (M.).

Aire géographique. — Région méditerranéenne jusqu'à l'Iran.