Aire géographique. — Soudan. Ethiopie. Afrique orientale.

243. **S. robustus** Kunth, Rev. Gram. 2, tab. 126 (1829), et Agrostogr. p. 213 (1833) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 928 ; M., C. 2365. — *S. Assakae* Caballero, B. Soc. Esp. Hist. Nat. 36, p. 148, tab. 14 (1936). — ♃. Herbe glaucescente. Rhizome longuement rampant, stolonifère, émettant des tiges fertiles et des innovations assez longues. Chaumes pouvant atteindre 2 m × 8 mm, simples ou rameux à la base, dressés, glabres, lisses, ± striés sous la panicule, couverts à la base par les gaines imbriquées des feuilles inférieures. Gaines arrondies sur le dos, striées, lisses, glabres, sauf la marge recouvrante finement poilue et souvent longuement ciliée dans sa partie supérieure, et la gorge longuement ciliée-barbue ; ligule réduite à une rangée de poils courts fasciculés ; limbe pouvant atteindre 60 × 0,7 cm, un peu raide, strié, glabre et lisse sur la face externe, fortement sillonné sur la face interne longuement villeuse à la base et légèrement scabre au-dessus, scabre sur les marges, ± convoluté, atténué au sommet en pointe non piquante. Panicule gris-verdâtre, à contour lancéolé, aiguë, pouvant atteindre 28 × 4 cm ; axe strié, glabre, lisse ; rameaux solitaires, dressés, assez longuement nus à la base, lisses, ramuleux, à épillets agglomérés en une masse linéaire dense ; pédoncules ordinairement < épillet, un peu scabres, légèrement renflés au



FIG. 303.
Sporobolus robustus.

sommet. Epillets légèrement comprimés latéralement, c. 2 mm, luisants. Glumes lancéolées, à la fin caduques, peu inégales, glabres, 1-nerviées, légèrement scabres sur la carène vers le sommet, aiguës, membraneuses, l'inférieure c. 2 mm, la supérieure c. 2,1 mm. Lemme membraneuse, lancéolée, 1-nerviée, lisse, 2-2,2 mm. Paléole ovale, bicarénée, lisse, bidentée au sommet, égalant la lemme. Lodicules c. 0,3 mm, largement obovées, arrondies ou ± tronquées au sommet, glabres. Anthères 3, jaunes, c. 1,25 mm. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux plumeux presque jusqu'à la base. Rachéole rarement prolongée au-dessus de la fleur en une petite baguette longuement villeuse, apprimée entre les 2 carènes de la paléole. Fruit non vu. Floraison : juin-octobre.

Marais saumâtres, très rare. — M. Embouchure de l'Oued Noun! (CABALLERO, OLLIVIER), Oued Drâa, Guelta Zerga (SAUVAGE).

Aire géographique. — Iles du Cap Vert. Afrique tropicale.