174. **A. papposa** Trin. et Rupr., Gram. Stip. p. 173 (1842). — ♃ ou parfois ①. Cespiteux dense, mais à innovations peu nombreuses. Chaumes atteignant 60 cm, peu rameux, dressés, glabres ou très finement pubérulents-scabres, à nœuds glabres. Gaines inférieures ± squamiformes, glabres, striées, non scabres ; les autres plus étroites, striées et un peu scabres, à oreillettes longuement ciliées ; ligule réduite à un rebord cilié ; limbes étroits, convolutés, parfois ± plans à la base, lisses ou à peine scabres en dessous, très scabres en dessus, avec quelque longs poils vers la base, atténués au sommet en une longue pointe sétacée. Panicule dressée, étroite, lâche, atteignant 12 cm, incluse à la base dans la gaine supérieure puis à la fin ± exserte ; axe anguleux un peu scabre ; rameaux semiverticillés, capillaires, nus sur une faible longueur ; rameaux et ramules un peu scabres ; pédoncules subclaviformes au sommet. Glumes légèrement inégales, glabres ; l'inférieure c. 8 mm, la supérieure c. 9 mm, toutes deux 3-nerviées, ± émarginées et mucronées au sommet. Lemme papilleuse au sommet, lisse au-dessous, c. 2 mm long., avec un callus de 1 mm, aigu, densément poilu, à poils supérieurs atteignant la moitié de la lemme ; colonne 5-7 mm, lâchement tordue, portant une touffe de longs poils au dessous de la trifurcation ; branche médiane de l'arête c. 3 cm, nue à la base sur une faible longueur, puis plumeuse avec une pointe nue courte, peu excurrente ; branches latérales nues, atteignant 1 cm. Anthères 3, jaunes, c. 2,8 mm. Floraison : après les pluies d'été.




FIG. 232. — *Aristida papposa.*

Pâturages pierreux, lits des torrents désertiques. — Plante du Sahara méridional atteignant nos limites dans le Sahara occidental : Tasiast ! (MURAT).

Aire géographique. — Iles du Cap Vert. Du Sénégal à l'Ethiopie.