Triraphis pumilio R. Br.



Han

Synonymes : *Diplachne nana* Nees (1841)
Triraphis glomerata A. Camus (1931)
Triraphis nana (Nees) Hack. (1890)

Le genre *Triraphis* appartient à la tribu des Danthonieae.

Description : espèce cespiteuse, formant de petites touffes denses (sub-hémisphériques), atteignant 5-20, voire 60 centimètres de haut et se densifiant en vieillissant. **Inflorescence** en panicules spiciformes ovales ou courtement ovalo-cylindriques. **Lemmes** aristées et velues, conférant à l'inflorescence un aspect de plumeau ou de pinceau.

Biogéographie : espèce à aire disjointe : saharo-sindienne à affinités tropicales et Afrique australe.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte.

Port : herbe annuelle cespiteuse.

Préférences édaphiques : espèce eury-psammophile.

Préférences hydriques : espèce eury-mésophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : plante assez irrégulièrement distribuée au Sahara méridional mais pouvant être localement abondante. Elle semble préférer les sols plus ou moins compacts bénéficiant d'une humidité prolongée (bas de pente, cuvettes). Indicatrice des zones d'accumulation hydrique modérée.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : faible. Peu appétée mais néanmoins susceptible de fournir, lorsqu'elle est bien développée, un médiocre abri aux larves.

Références bibliographiques

Ozenda	174	Quézel & Santa	112	Barry & Celles	421	Nègre	



Jeune touffe présentant une coloration foncée des inflorescences.



Belle touffe (15 cm de haut) en fin de cycle.



Détail de l'inflorescence.

